

## 사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 약에 알레르기증상을 일으킨 경험이 있는 환자
- 4) 다음 증상이 있는 환자 : 눈의 통증이 심한 경우
- 5) 다음 진단을 받은 환자 : 녹내장

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

1) 사용후 다음 증상이 나타난 경우

- 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
- 눈 : 충혈, 가려움, 부기

2) 눈의 흐림이 개선되지 않는 경우

- 3) 하드콘택트렌즈를 장착한 환자에서 눈곱 등의 분비물이 많고, 렌즈가 흐려지는 경우
- 4) 2주간정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의사항

1) 소아에 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래에서 사용할 것.

- 2) 용기의 앞쪽이 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게할 것. 또한, 혼탁(어지러움, 흐림)한 것은 사용하지 말 것.
- 3) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용할 것.
- 4) 용법·용량을 엄수할 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것. 특히 자동차 안이나 난방기구의 근처 등 고온이 될 우려가 있는 장소에 방치하지 말 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 다른 사람과 공용하지 말 것.
- 5) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 말 것. 또한, 사용기한 내에 있더라도 개봉 후에는 신속히 사용할 것.