

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 알러지성 결막염에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1적, 1일 2~4회 또는 상태에 따라 적절히 점안합니다. 유.소아는 의사의 처방에 따릅니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 1세 미만의 소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 알레르기 치료 (탈감작요법 등)를 받고있는 사람, 약물 등에 의한 알레르기 증상 경험자, 가려움을 동반한 눈의 통증, 알레르기에 의한 증상인지 분명하지 않은 사람, 임부 또는 수유부는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 사용 후 드물게 졸음이나 진정작용이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계조작 시 조심하십시오. 점안 후 시야가 흐려지는 것을 경험한 사람은 시야가 뚜렷해질 때까지 운전 및 기계조작을 하지 마십시오. 1주 정도 사용하여도 증상의 개선이 없을 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 이 약은 점안용으로만 사용하십시오. 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로, 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 또한, 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 마십시오. 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오. 소프트 렌즈를 착용한 상태에서 사용하지 마시고 투여 후 적어도 15분이 경과한 후에 렌즈를 착용하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 점안제와 함께 사용 시 적어도 5분 이상 시간차를 두고 투여하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

눈의 충혈, 자극감, 가려움 지속, 안검염(눈꺼풀염), 눈의 흐림이 개선되지 않는 경우, 안검(눈꺼풀)피부염 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 일시적인 작열감, 충혈, 부종, 가려움증과 같은 국소자극이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

15~25도에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 개봉 후 4주가 지나면 사용하지
마십시오.