

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 재발성 구순포진의 초기 치료에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 환부의 가장자리까지 충분히 적용할 수 있는 적당량으로 하여 1일 5회, 5일동안 사용합니다.이 약의 치료기간은 5일 이내로 제한합니다.치료는 초기증상 및 증후가 보이는 즉시 가능한 빨리 시작합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 피부감염증(결핵, 매독, 칸디다증, 백선, 대상포진, 수두, 종두증, 옴, 사면발이), 면역계의 손상(골수이식이나 AIDS) 환자, 고막 천공이 있는 습진성 외이도염, 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상 및 동상, 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자, 수유부, 18세 미만의 소아, 심근경색 및 경험자는 이 약을 사용하지 마십시오.이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 고령자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.입술이나 입 주변의 구순포진에만 사용하고 눈, 코 입안 및 생식기에는 사용하지 마십시오.징후나 증상이 없는 사람에게는 사용하지 마십시오.타 인으로의 감염이나 재발성 단순포진 감염증의 예방 목적으로 사용하지 마십시오.이 약물을 희석하거나 다른 약물을 혼합하기 위한 기제로 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

프로베네시드와 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

흔하게 건조감, 피부 벗겨짐, 때때로 일시적인 작열감, 저림, 드물게 홍반, 색소침착, 염증의 증상 및 증후를 포함하는 적용부위반응, 접촉성피부염 그리고 전염성 농가진, 모낭염, 칸디다증, 백선, 모낭염, 부스럼, 피부 자극, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 땀띠, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증, 안검피부에 사용 시 안압 상승, 녹내장(시야흐림, 시력장애) 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.전신 흡수로 인해 가역적인 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨와 시력 장애 등이 나타날 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.