

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증 환자
- 2) 병소(아픈 부위)에 2차 감염 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 적용 부위에 점막의 외상(상처) 또는 패혈증 환자
- 2) 뇌전증 환자
- 3) 심장 전도 이상, 서맥(느린 맥), 간기능 손상, 중증(심한 증상)의 속 환자
- 4) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

1) 속 : 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 혈압저하, 안면(얼굴)창백, 맥박의 이상, 호흡억제 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 중추신경계

① 진전(떨림), 경련 등의 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨) 투여 등 적절한 처치를 한다.

② 졸음, 어지러움, 신경과민, 의식소실(없어짐) 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 속 또는 중독한 증상으로 이행하는 것에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 한다.

3) 저혈압, 심근억제, 서맥(느린 맥), 심정지 등의 심장 억제 작용이 나타날 수 있다.

4) 자극감 등 과민증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

4. 일반적 주의

- 1) 경증(가벼운 증상)의 병소(아픈 부위)에만 사용한다.
- 2) 장기간 사용하지 않는다.
- 3) 이 약은 벤조산을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미(가벼운)한 자극이 될 수 있다.

5. 상호작용

이 약과 부정맥용제(예 : 토카이니드)를 병용투여(함께 사용)하는 경우, 이상반응이 증강될 수 있으므로 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료 상의 유익 성이 위험성을 상회한다(웃돌다)고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 이 약은 모유로 이행되나 치료용량으로는 영아(갓난 아이)에 대한 위험성은 없는 것으로 보인다.

7. 적용상의 주의

안과용으로 사용하지 않는다.