

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약, 이 약 성분 및 기타의 펠비낙제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다)
- 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 대한 두드러기 또는 급성 비염(코염)의 병력이 있는 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 만15세 미만의 소아

2. 이 약을 사용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약을 붙이고 목욕할 때는 강한 자극을 느끼기 때문에 입욕 30분 이상 전에 제거할 것. 또는 목욕 후 30분 이상 경과 한 후 사용할 것.
- 2) 첩부환부(질환 부위)를 회로나 전기모포 등으로 따뜻하게 하지 말 것.
- 3) 2주 연속 사용하지 말 것.
- 4) 피부가 약한 사람은 같은 부위에 계속 붙이지 말 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 이 약 사용에 의해 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 부기, 따끔거림, 염증 및 물집 등이 나타날 경우
- 2) 속(아나필락시스): 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
- 3) 5~6일 동안 투여 후에도 증상이 좋아지지 않는 경우

5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 용량을 준수할 것.
- 2) 이 약은 통증과 부기 등의 원인이 되는 질병을 치료하는 것이 아니라 통증과 부기 등의 증상만을 치료하는 약이므로 증상이 있는 경우에만 사용할 것.
- 3) 땀을 흘리거나, 환부(질환 부위)가 젖어 있을 때는 잘 닦은 후 사용할 것.
- 4) 피부가 약한 사람은 사용전에 팔 안쪽의 피부가 약한 부분에 1~2cm정도의 작은 조각을 기 준으로 반나절 이상 붙여 박진·박전(충혈되어 붉어짐) 가려운 열증 등의 증상이 발생하지 않는다고 확인한 후 사용할 것

5) 눈 주위 및 점막 등에 사용하지 말 것.

6) 습진, 염증, 무좀, 벌레물림, 화농(끓음)성 부위 또는 상처 부위에 사용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

4) 품질유지를 위해 사용하지 않는 분은 봉투에 넣어 입구의 지퍼를 닫아 보관할 것.

5) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말고, 사용기간 내라도 개봉 후 가급적 빨리 사용할 것.