용법용량

이 약은 음식물 섭취와 관계없이 투여할 수 있다.

다원자가 양이온을 함유한 완하제, 제산제 또는 철, 아연, 셀레늄, 칼슘, 마그네슘을 함유한 경구 보조제는 이 약과 함께 복용하면 안 된다(사용상의 주의사항 5. 상호작용 참조).

이 약은 아래 용법, 용량에 따라 투여한다.

1. 인플루엔자 A형 또는 B형 바이러스 감염증의 치료: 증상이 나타난 지 48시간 이내에 이 약을 단회 경구투여한다.

1) 성인 및 만 12세 이상 소아:

체중에 따른 이 약의 권장 용량은 아래 표 1과 같다.

표 1. 성인 및 만 12세 이상 소아에서의 체중에 따른 이 약의 용량

체중(kg)	권장 경구 용량
40kg 이상 ~ 80kg 미만	40mg
80kg 이상	80mg

2) 만 1세 이상 만 12세 미만 소아:

체중에 따른 이 약의 권장 용량은 아래 표 2와 같다.

표 2. 만 1세 이상 만 12세 미만 소아에서의 체중에 따른 이 약의 용량

체중(kg)	권장 경구 용량
10~20kg 미만	10mg
20kg 이상 ~40kg 미만	20mg
40kg 이상	40mg

2. 노출 후 인플루엔자 A형 또는 B형 바이러스 감염증의 예방: 증상이 있는 사람과 밀접한 접촉 후 이 약을 단회 경구투여한다.

1) 성인 및 만 12세 이상 소아:

체중에 따른 이 약의 권장 용량은 아래 표 3과 같다.

표 3. 성인 및 만 12세 이상 소아에서의 체중에 따른 이 약의 용량

체중(kg)	권장 경구 용량
40kg 이상 ~ 80kg 미만	40mg

80kg 이상	80mg

2) 만 1세 이상 만 12세 미만 소아:

체중에 따른 이 약의 권장 용량은 아래 표 4와 같다.

표 4. 만 1세 이상 만 12세 미만 소아에서의 체중에 따른 이 약의 용량

체중(kg)	권장 경구 용량
20kg 이상 ~ 40kg 미만	20mg
40kg 이상	40mg

간기능 장애 환자:

경증 (Child-Pugh class A) 및 중등도 (Child-Pugh class B) 간기능 장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않다. 중증 간기능 장애 환자에서 이 약은 평가되지 않았다.