

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위산과다, 속쓰림, 신트림에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

16세 이상은 1회 1정(10 mg), 1일 2정(20 mg)까지 복용할 수 있습니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약 및 H₂ 수용체 길항제에 과민증 경험자, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자, 대두유에 과민증 또는 알레르기 경험자, 콩 또는 땅콩에 과민증 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우, 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속되는 경우, 현기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우, 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우, 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우, 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우, 약물들에 대한 과민증 경험자, 신장장애(신장장애), 심질환, 간장애, 고령자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자, 혈액투석환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 14일 이상 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하기 전에 비스테로이드성 소염(항염)진통제, 무좀치료제 및 항진균제(이트라코나졸 및 포사코나졸 경구현탁액 등), 티로신 키나아제 억제제(다사티닙, 엘로티닙, 게피티니브, 파조파닙 등)를 복용하는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정주용 지질제를 투여받고 있는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 복용 중에는 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

속, 아나필락시스, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기, 백혈구, 적혈구, 혈소판, 호산구 감소, 빈혈, 지혈지연, 피부점막안증후군, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반), 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 · LDH 상승, 황달, 간염, 근육통, 횡문근융해증, 관절통, 근육경련, 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림), 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리 무거움), 혼돈, 우울, 어지러움, 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부 팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염), 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순, 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지 경련, 여성형 유방, 미각 이상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.