e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 코감기(급성 비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움 증상의 완화에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 12세 이상 및 성인은 1회 1번씩, 1일 1~3회 각 비강에 분무합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하되 1일 3회를 초과하지 마십시오. 매 회 최소 8시간 이상 간격을 두고 적용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 및 경험자, 만 12세 미만의 어린이, MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람은 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 알레르기 체질, 알레르기 증상(발열, 발진, 발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등) 경험자, 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 마십시오. 7일 이상 계속하여 사용하지 마십시오. 사용 후 졸음이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계조작 시 주의하십시오. 3일간 사용하여도 증상의 개선이 없을 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)와 함께 사용하지 마십시오. 사용 중에는 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진, 발적, 부종, 자극감, 가려움 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.