

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 재발성 구순포진의 초기 치료에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 환부의 가장자리까지 충분히 적용할 수 있는 적당량으로 하여 1일 5회, 5일동안 사용합니다. 치료는 초기증상 및 증후가 보이는 즉시 가능한 빨리 시작합니다. 이 약의 치료기간은 5일 이내로 제한합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증, 세균(결핵, 매독 등) · 진균(칸디다증, 백선 등) · 단순포진(Herpes simplex)를 제외한 바이러스(대상포진, 수두, 종두증 등) · 동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자, 골수이식환자나 AIDS 환자처럼 심각하게 면역계가 손상된 환자, 고막 천공이 있는 습진성 외이도염, 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상 · 동상, 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자, 수유부, 18세 미만의 소아, 심근경색 및 경험자, 눈, 코, 입안 및 생식기에는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 고령자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약 사용 중에는 수유를 하지 마십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

흔하게 건조감, 피부 벗겨짐, 때때로 일시적인 작열감, 저림, 드물게 홍반, 색소침착, 염증의 증상 및 증후를 포함하는 적용부위반응, 접촉성피부염, 전염성 농가진, 모낭염, 칸디다증, 백선, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 땀띠, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증, 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장, 빈도불명의 시야흐림 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.