사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

3) 약에 알레르기증상을 일으킨 경험이 있는 환자

4) 다음 증상이 있는 환자 : 눈의 통증이 심한 경우

5) 다음 진단을 받은 환자 : 녹내장

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

1) 사용후 다음 증상이 나타난 경우

- 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움

- 눈 : 충혈, 가려움, 부기

2) 눈의 흐림이 개선되지 않는 경우

3) 하드콘택트렌즈를 장착한 환자에서 눈곱 등의 분비물이 많고, 렌즈가 흐려지는 경우

4) 2주간정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의사항

1) 소아에 사용하는 경우에는 보호자의 지도감독 아래에서 사용할 것.

2) 용기의 앞쪽이 눈꺼풀, 속눈썹에 닿지 않게할 것. 또한, 혼탁(어지러움, 흐림)한 것은 사용하지 말 것.

3) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용할 것.

4) 용법·용량을 엄수할 것.

4. 저장상의 주의사항

1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것. 특히 자동차 안이나 난방기구의 근처 등 고온이 될 우려가 있는 장소에 방치하지 말 것.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

4) 다른 사람과 공용하지 말 것.

5) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 말 것. 또한, 사용기한 내에 있더라도 개봉 후에는 신속히 사용할 것.