

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1정씩, 1일 3회 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증, 투석 요법을 받고 있는 사람, 고마그네슘혈증, 고인산혈증, 변비, 장협착증, 급성 충수염 환자, 임신초기 3개월 이내의 여성, 만 7세 미만의 소아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부, 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람, 신장장애 환자 및 신질환 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 복용할 때는 구내마비감 등을 남기지 않기 위해 신속하게 삼키십시오. 신경조직과 뼈조직에 대한 알루미늄의 축적에 주의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

테트라사이클린계 항생제와 함께 복용하지 마십시오. 디곡신, 캅토프릴, 시메티딘, 라니티딘, 파모티딘, 테오피린, 프로프라놀롤, 아테놀롤, 황산철, 클로르프로마진, 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤롤, 레보도파, 시프로플록사신, 오픈록사신, 케토데옥시콜린산, 불화나트륨, 이소니아지드, 에녹사신, 노르플록사신, 레보티록신, 쿠마린유도체, 철, 탄산음료와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 알루미늄이 함유된 제산제의 복용후, 1~2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

설사, 변비, 복부(배부분)팽만, 피부발진, 마비감, 인산염 결핍증, 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

