

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 무좀, 완선(사타구니백선), 백선에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1일 1회 적당량을 환부(질환 부위)에 도포한다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 또는 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람 및 수유부, 유·소아는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약에 과민증 환자 또는 알레르기 경험자, 알레르기 체질, 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람, 질환부위가 깊은 사람, 「습진」과 「무좀 · 완선(사타구니백선), 체부백선」의 구분이 불확실한 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 눈과 눈 주위, 점막(예를 들어 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부, 습진, 습기참, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위, 손톱, 두피에는 사용하지 마십시오. 2주정도 사용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 질환 부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용하십시오. 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 온수로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받으십시오. 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 마십시오. 이 약은 외용으로만 사용하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

염증, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 상처, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐, 통증, 색소 침착, 자극감, 열감, 인바늘, 짓무름, 수포, 발진 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증, 붓기, 두드러기 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사용기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 화기 근처에 두지 마십시오.