용법용량

1. 전처치

이 약의 매 투여 전에 주입 반응의 빈도 및 심각도를 감소시키기 위해 아래와 같은 전처치가 권장된다.(사용상의 주의사항 1. 경고 1) 주입반응 항 참조)

전처치 종류	투약 방법	예시(또는 동등)	전처치 시기
코르티코스테로이드	정맥투여(IV)	메틸프레드니솔론 80~125 mg	투약 30분 전
항히스타민제	경구	디펜히드라민 25~50 mg	투약 30~60분 전
해열제	경구	아세트아미노펜 500~650 mg	투약 30~60분 전

2. 용법·용량

- 부하용량: 첫 투여에 이 약 300 mg을 투여하고, 2주 후에 이 약 300 mg를 정맥 투여한다.

- 유지용량: 그 이후(첫 투여일을 기준으로 6개월 후)부터는 6개월 간격으로 이 약 300 mg을 정맥 투여한다.

이 약은 약 90분간 아래 표1과 같이 주입속도를 증가시키며 정맥 내 점적 투여한다. 멸균된 저단백 결합 0.2 또는 0.22 미크론 인-라인(in-line) 필터를 포함한 정맥 라인을 통해 투여한다.

표1. 250 mL의 점적투여 백에 희석한 경우의 권장용법

경과 시간(분)	주입 속도(mL/hr)
0-30	42
31-60	125
61-투여 완료	333

이 약은 심각한 주입 반응과 같은 잠재적인 심각한 반응을 관리할 수 있는 환경에서 숙련된 의료 전문가의 면밀한 감독 하에 투여하여야 한다. 투여 중 및 투여완료 1시간 후까지 주입 반응에 대해 면밀히 관찰한다.(기타 조제방법 등은 사용상의 주의사항 8. 적용상의 주의 항 참조)