

용법용량

이 약은 항암화학요법에 경험이 있는 의사의 감독 하에 투여하여야 한다.

• 복용방법

이 약은 1일 1회, 1회 480 mg(6정)을 공복시 경구투여한다.

이 약을 식후투여하는 경우에는 체내 노출이 증가하여 이상반응이 증가할 수 있으므로, 식전 1시간부터 식 후 2시간까지는 투여하지 않는다.

• 용량 조절

이 약 투여 후 약물 이상반응이 발생하는 경우, 다음 표와 같이 이 약의 용량을 감량하거나, 투여를 보류하거나 또는 중단한다.

표 1. 용량감소 권장량

	투여량
권장 시작용량	480 mg
1차 용량 감소	320 mg
2차 용량 감소	160 mg

표 2. 약물이상반응에 따른 투여 보류, 용량 감량 또는 투여 중단

이상반응*		처치
4등급 중성구 감소증		• 3등급 이하로 회복될 때까지 투여 중단한다. 회복 후, 동일 용량으로 투여를 재개할 수 있다. • 재개 후 재발하는 경우, 회복될 때까지 이 약을 중단해야 한다. 회복 후, 한 단계 낮은 용량으로 투여 재개할 수 있다. • 2등급 이하로 회복될 때까지 투여를 중단한다. 회복 후, 동일 용량으로 투여를 재개할 수 있다. • 재개 후 재발하는 경우, 회복될 때까지 이 약을 중단해야 한다. 회복 후, 한 단계 낮은 용량으로 투여 재개할 수 있다.
3등급 이상의 발열성 중성구 감소증		
3등급 혈소판 감소증 (출혈 동반)		
4등급 혈소판 감소증		
3등급 이상의 혈액독성 (혈소판 감소증 및 중성구 감소증 제외)		
3등급 이상의 비혈액학적 독성 (간질성 폐질환 및 피부 장애 제외)		
간질성 폐질환	2 또는 3등급	• 1등급 이하로 회복될 때까지 이 약을 중단해야 한다. 회복 후, 동일 용량으로 투여를 재개할 수 있다. • 재개 후 재발하는 경우, 회복될 때까지 이 약을 중단해야 한다. 회복 후, 한 단계 낮은 용량으로 투여 재개할 수 있다.
	4등급	
피부 장애	2등급	

		• 항히스타민제, 부신피질 호르몬 등을 투여하여 증상이 회복되면 투여를 지속할 수 있다. • 항히스타민제, 부신피질 호르몬 등을 투여하여도 회복되지 않으면, 용량을 한 단계 낮추거나 투여를 중단한다.
	3등급 이상	• 2등급 이하로 해결될 때까지 이 약 투여를 중단해야 하며 항히스타민제, 부신피질 호르몬 등을 투여한다. 회복 후, 한 단계 낮은 용량으로 투여 재개할 수 있다.
	눈 점막 피부 증후군 (스티븐스-존슨 증후군), 독성 표피괴사 용해	• 투여를 중단한다.
* 등급은 NCI-CTCAE ver. 4.0에 따른다.		