

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨 결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뺨통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 15세 이상 및 성인은 1회 1~2캡슐씩, 1일 1~3회 공복(빈 속)시를 피하여 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세 잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 위장출혈을 일으킬 수 있습니다. 조절되지 않는 고혈압, 울혈심부전증, 확립된 허혈성 심장질환, 말초동맥 질환, 뇌혈관질환을 가진 환자는 고용량 이부프로펜(1일 2,400 mg) 복용을 피해야 하며, 심혈관계 위험 요소(고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연 등)를 가지고 있는 환자는 고용량 이부프로펜(1일 2,400 mg) 복용이 필요한 경우 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 콩 또는 땅콩에 과민증 환자, 대두유에 알레르기 반응 경험자, 이 약 및 이 약의 구성 성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람, 만3개월 미만의 영아, 임신 30주 이후는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 황색4호, 황색5호에 과민증 환자, 약에 의한 알레르기(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등) 경험자, 만 3개월 이상 및 만 2세 미만의 영·유아, 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이, 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람, 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈 문제를 가지고 있는 사람, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람, 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람, 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자, 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 복용 중에 음주하지 마십시오. 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 해열진통제, 감기약, 진정제와 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 부종(부기), 드물게 아나필락시속(과민성쇼크 : 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군 : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상), 천식, 매우 드물게 다형성 홍반, 탈락 피부염, 빈도불명의 광민감 반응, 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 반응(DRESS 증후군), 급성전신발진고름물집증이 나타날 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.