

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 피임에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

정제는 매일 대략 같은 시간에, 물과 함께, 포장에 표시된 순서대로 복용해야 합니다. 첫 번째 정제는 생리 첫 날에 복용하고 출혈이 나타나더라도 이후 매일 1정씩 지속적으로 복용합니다. 이전 포장에 이어서 새로운 포장을 개봉하여 복용합니다. 자세한 사항은 허가사항 상세정보를 참고하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

임부 및 수유부, 활동성 정맥혈전색전성 장애, 혈전색전증, VTE, 심부정맥혈전증 및 폐색전증, 간 기능 값이 정상으로 돌아오지 않는 심각한 간 질환 또는 경험자, 알려진 또는 의심되는 성 스테로이드 민감성 악성 종양, 진단되지 않은 질 출혈, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 유방암 환자 또는 경험자, 간 기능 장애, 당뇨병, 고혈압, 기미 환자, 우울증 또는 경험자, 수술이나 질병으로 인한 지속적인 운동 불능 상태의 환자, 흡연자는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

간 마이크로솜 효소를 유도하는 약물, 바르비탈류, 보센탄, 항전간(간질)제(카르바마제핀, 페니토인, 프리미돈), 리팜피신, 에파비렌즈, 옥스카르바제핀, 토피라메이트, 펠바메이트, 세인트존스워트를 함유하는 물질, HIV단백분해효소(리토나비어, 넬피나비어)와 비뉴클레오시드 역전사효소 저해제, C형 간염 바이러스와의 조합(HCV) 의약품, 고도(케토코나졸, 이트라코나졸, 클래리스로마이신) 또는 중등도(플루코나졸, 딜티아젬, 에리트로마이신)의 CYP3A4 억제제와 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

유방분비물, 혈관부종, 기분 변화, 우울감, 성욕 감소, 두통, 구역질, 여드름, 유방통, 불규칙한 월경, 무월경, 체중 증가, 흔하지 않게 질 감염, 콘택트 렌즈 불내성, 구토, 탈모증, 월경 곤란, 난소 낭종, 피로 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.