

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 눈의 피로, 결막충혈, 수영 후 눈의 불쾌감 또는 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때, 자외선 및 기타 광선에 의한 눈의 염증, 눈꺼풀의 짓무름, 하드콘택트렌즈 착용 시 불쾌감, 눈의 가려움, 눈곱이 많을 때 등의 눈의 침침함에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1회 2~3방울씩, 1일 5~6회 눈에 넣으십시오. 눈에 넣은 후 남은 액과 용기는 버리십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약을 사용하기 전에 눈의 통증이 심한 사람, 안약에 의한 눈의 충혈, 가려움, 부종, 발진, 충혈되어 붉어짐 등의 알레르기 반응 경험자, 녹내장 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약 사용에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않거나 수일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않는 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 과도하게 사용할 경우 오히려 충혈을 일으킬 수 있습니다. 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도 감독 하에 투여하십시오. 잘못하여 의복 등에 착색되었다면 물로 세척하여 제거하십시오. 이 약은 점안용, 즉 눈에 넣는 약으로만 사용하십시오. 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오. 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿게 하지 마십시오. 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 흐려질 수 있습니다. 아울러 흐려진 약은 사용하지 마십시오. 오염을 방지하기 위해 공동으로 사용하지 마십시오. 개봉한 것은 가능한 빨리 사용하며, 사용기한을 초과한 것은 사용하지 마십시오. 보존상태에 따라서 성분중의 결정이 용기의 점안구 주위와 뚜껑 내측에 붉게 붙는 경우에는 청결한 가아제로 가볍게 닦아 사용하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

눈의 충혈, 가려움, 부종 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.