

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 골관절염, 어깨관절주위염, 건·건초염(힘줄염·힘줄윤활막염), 건주위염(힘줄주위염), 상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창(부기), 동통(통증)의 진통·소염에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

1회 1매를 1일 1회 약면의 박리(벗겨내기)지를 떼어낸 후 부착합니다. 의사의 지시가 없는 경우 치료기간은 14일을 넘지 않도록 하며 24시간마다 약을 교체하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증, 아스피린, 기타 진통제 또는 비스테로이드성 소염(항염)진통제 과민증(기관지 경련, 혈관부종, 천식, 알레르기성 비염, 발진, 아나필락시스 반응) 또는 경험자, 기관지 천식 또는 경험자, 위장관 출혈 환자 또는 경험자, 위·십이지장 궤양 또는 소화성궤양 경험자, 중증의 심부전, 중증의 신장, 간손상 환자, 12세 이하의 소아, 임신 3기 및 수유부, 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처 및 염증 부위, 민감한 피부, 출혈성 피부질환, 감염된 피부, 화상 부위에는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 고령자, 만성 기관지염, 알레르기성 비염 또는 코점막 염증 환자, 위장관 궤양·출혈 또는 천공, 궤양성 대장염, 크론병 경험자, 간·신장 기능 장애 또는 심부전 환자, 고혈압, 신질환 경험자, 임부(꼭 필요한 경우의 임신 1기와 2기) 및 임신 계획 중인 여성, 아스피린·이부프로펜 복용 후 불내성을 일으킨 환자, 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)경험자, 알레르기 체질, 심한 습윤(습기 참)·미란(긁무름), 순환기 장애, 당뇨병, 감염을 수반하는 염증, 만성질환(퇴행성관절염(골 관절염) 등)환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 질환 부위는 청결하게 하고, 땀 등은 잘 닦은 후 붙이십시오. 목욕 30분 전 또는 1시간 전에 떼고 목욕 직후의 찜부는 피하십시오. 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오. 눈 또는 눈주위, 점막에 사용하지 않으며 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 밀봉봉대법을 사용하지 않고 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출하지 마십시오. 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 없을 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(NSAIDs), 코르티코스테로이드, 항응고제, 항혈소판제를 함유한 다른 약물과 함께 사용하지 마십시오. 혈압강하제, 아스피린, 비스테로이드성 소염(항염)진통제 등과 함께 사용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진·발적, 가려움, 홍조, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 피부박탈, 피부건조, 가려움, 고름집·고름물집 형성, 두드러기, 화끈감, 두통·구역·구토·열·땀·의식혼탁(어지러움, 흐림) 등의 증상을 수반하는 무균성 뇌막염, 입마름, 맛의 변화, 얼굴부기, 잔물집, 전신권태, 인설(비늘, 껍질), 속 증상, 접촉피부염, 홍반, 국소 과민증, 광과민증, 중증 피부 이상반응(호산구 증가 및 전신증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군), 급성전신 발진고름물집증, 다형성 홍반, 탈락 피부염, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사용해(리엘증후군) 포함) 등이 나타나는 경우 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.