

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부감염증(족부백선(15세 이상의 청소년 및 성인에 한함))에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

이 약은 단 1회 사용하십시오. 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨 후 환부와 그 주위가 충분히 적셔지도록 충분한 양을 바르십시오. 진균의 완벽한 치료를 위해서는 병소가 나타나지 않은 쪽 발이라 할지라도, 양쪽 발 모두에 적용하십시오. 이 약을 발가락 사이 모두 얇게 펴 바르고 발바닥 전체와 발바닥으로부터 약 1.5cm 높이까지 이 약을 적용하며 1~2분간 건조시키십시오. 이 약 적용 시에는 문질러 바르지 마십시오. 사용 후에는 손을 깨끗이 세척하십시오. 이 약의 효과를 높이려면 적용 후 24시간 동안 씻지 않고 그대로 두십시오. 1주가 지난 후에도 개선의 징후가 보이지 않으면, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 경험자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부, 유아는 이 약을 사용하지 마십시오. 프로필렌글리콜에 과민증 환자는 주의하여 사용하십시오. 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 마십시오. 에탄올 등의 알코올성 기제가 국소자극을 일으킬 수 있으므로 영·유아 또는 점막부위에 이 약 투여시 주의하십시오. 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의하십시오. 이 약은 외용으로만 사용하십시오. 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말며 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 내십시오. 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 마십시오. 자극을 일으킬 수 있으므로 균열(갈라짐), 미란(긁힘) 부위에는 주의하여 사용하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

피부의 두드러기, 발적, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리, 자통(刺痛), 작열감이 적용부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.