

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원인 불명의) 두드러기, 피부가려움증, 습진, 피부염(하이드로코티손 외용제와 병용(함께 복용(사용))에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인 및 6세 이상의 소아는 세티리진염산염으로써 1일 1회 10 mg을 취침 전에 경구 투여(복용)하십시오. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5 mg씩을 아침, 저녁에 분할 복용합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오. 신장장애(신장(콩팥)장애) 환자는 환자의 신(콩팥)기능에 따라 투여 간격 및 용량을 조절해야 합니다. 자세한 사항은 허가사항을 참고하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 또는 경험자, 신(콩팥)부전 환자(크레아티닌 청소율 < 10 mL/min), 6세 미만의 유아, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 신장장애(신장(콩팥)장애), 간장애 환자, 노인, 뇌전증 환자 및 발작 위험성이 있는 환자, 소변고임의 선행요인(척수 병변(병에 의한 몸의 변화), 전립선(전립샘)비대증)이 있는 환자, 임부, 수유부는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 알레르기 항원피내반응검사를 받는 환자의 경우 검사 실시 3~5일 전에는 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

테오필린, 리토나비르와 함께 복용하지 마십시오. 과량의 알코올과 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

졸음, 두통, 때때로 권태감, 마비감, 무력증, 초조, 감각이상, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 머리 무거움, 흥분, 경련, 운동이상, 근육 긴장이상, 실신, 떨림, 공격성, 혼돈, 우울, 환각, 불면증, 틱 장애, 기억상실, 기억장애, 자살관념, 악몽, 목마름, 입술건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통(배 아픔), 위통, 복부(배부분)불쾌감, 설사, 드물게 구토, 위장장애, 입술염, 미각이상, 식욕증진, 빠른맥, 부정맥, 혈압상승, 두근거림, 혈관염, 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 단구 증가, 혈소판 증가, 혈소판 감소, 광과민증, 과민증 및 과민성 쇼크, 때때로 부기, 가려움, 발진, 드물게 두드러기, 혈관신경성

부종(부기), 고정약물발진, 급성 전신 발진농포(고름물집)증, 시야 흐림, 결막충혈, 안조절 장애, 안운동발작, 현기증(어지러움), AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ -GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상으로 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달, 간염, BUN 상승, 당뇨, 피석인 소변, 드물게 배뇨(소변을 똥) 곤란, 야뇨증, 소변고임, 관절통, 근육통, 인두염, 기침, 코피, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 가슴통증, 드물게 월경불순, 귀울림, 비염, 체중 증가가 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약 투여 중단 후 가려움증, 두드러기가 나타날 수 있습니다. 발생하는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.