

## e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 눈의 건조 또는 바람이나 태양에 의한 화끈거리는 증상, 자극감, 불쾌감의 일시적인 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

필요 시 증상이 있는 눈에 1~2방울 넣으십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 눈의 통증이 심한 사람, 안약에 의한 눈의 충혈, 가려움, 부종, 발진 등의 알레르기 증상 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약은 점안용, 즉 눈에 넣는 약으로만 사용하십시오. 실수로 이 약을 먹은 경우 즉시 의사 등 전문가의 도움을 받으십시오. 1회 사용 후 재사용하지 마십시오. 눈에 넣은 후 남은 액과 용기는 버리십시오. 증상이 악화되거나 72시간 이상 지속되는 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약의 오염과 눈의 손상을 피하기 위하여 용기의 끝이 눈이나 외부에 닿게 하지 마십시오. 약의 색이 변했거나 혼탁된 것은 사용하지 마십시오. 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 마십시오. 콘택트렌즈는 이 약 사용 전에 제거하십시오. 다시 착용은 눈에 넣은 뒤 15분 후에 하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 다른 점안제와 동시에 사용할 경우에는, 이 약을 사용하기 전에 최소한 15분의 간격을 두고 사용하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

가려움, 부종, 눈의 통증, 시야의 변화, 지속적인 눈의 충혈 또는 자극감 등의 증상이 나타나는 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 하드콘택트렌즈를 착용하는 사람에게서 눈곱 등의 분비물이 많아지면서 드물게 렌즈가 흐려지는 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 높은 점도로 인해 이 약을 눈에 넣을 때 일시적으로 눈이 흐릿해질 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.