

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 코감기, 알레르기성 비염, 또는 부비동염에 의한 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움 증상의 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 7세 이상 및 성인은 1회 1번씩, 1일 2회 양쪽 코 안에 뿌리십시오. 매 10~12시간 간격을 두고 사용하십시오. 24시간 동안 2회를 초과하지 마십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

만 7세 미만의 어린이 및 만 2세 미만의 영아, 이 약에 과민증 환자 또는 경험자는 이 약을 사용하지 마십시오. 이 약을 사용하기 전에 알레르기 체질, 비염용 분무제를 포함한 약에 의한 알레르기 증상 경험자, 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 프로펠렌글리콜 과민증 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약을 사용하기 전에 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약을 사용하기 전에 흡연, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 및 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침이 있는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약은 비염용 분무제, 즉 코 안에 뿌리는 약으로만 사용하십시오. 눈과 귀에는 사용하지 마십시오. 오염을 방지하기 위해 공동으로 사용하지 마십시오. 3일간 사용하여도 좋아지지 않을 경우 사용을 즉시 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 사용하는 동안 졸음이 올 수 있습니다. 자동차 운전 또는 기계류 운전 조작 시 주의하십시오. 어린이는 보호자의 지도 및 감독하에 사용하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있습니다. 7일 이상 계속 사용하지 마십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

우울증, 파킨슨병 치료 등에 사용되는 MAO억제제를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람은 이 약을 사용하지 마십시오. 사용시에는 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진 및 충혈되어 붉어지는 발적, 부종, 자극감, 가려움 등이 나타나는 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약에는 벤잘코늄염화물이 함유되어 있어 기관지 경련을 일으킬 수 있습니다.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.