

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 육체 피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급과 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염의 완화, 각기, 눈의 피로에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 19세 이상은 1일 1회, 1회 1정 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 만 12개월 미만의 젖먹이, 고칼슘혈증, 유육종증, 신장(콩팥)질환, 신장(콩팥)결석, 심한 증상의 신부전, 대두유 과민증 또는 알레르기 반응 경험자, 콩 또는 땅콩에 과민증 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아, 고령자(노인), 고옥살산뇨증, 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환, 심장·순환 기계기능 장애, 신장(콩팥) 장애, 저단백혈증 환자, 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자, 신장(콩팥)결석 경험자, 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있으며, 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파와 함께 복용하지 마십시오. 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제와 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전, 후에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 몹은 변, 구내염(입안염), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상

복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)이 나타나거나, 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아지거나, 출혈이 오래 지속되거나, 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.