e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 춥고 떨리는 증상의 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통 등 감기의 여러 증상의 완화에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 15세 이상의 청소년 및 성인은 1회 1포씩, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다. 필요한 경우는 취침 시에 복용할 수 있습니다. 복용 간격은 4시간으로 하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다. 매우 드물게 치명적일 수 있는 급성전신발진고름물집증, 피부점막안증후군 (스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해 (리엘증후군)와 같은 중대한 피부반응이 보고되었고 이 약 복용 후 피부발진 또는 다른 과민반응의 징후가 나타나는 경우 즉시 복용을 중단하십시오. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량 (4,000 mg)을 초과하여 복용하지 마십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다. 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하지 마십시오. 급성전신발진고름물집증과 같은 중증 피부이상반응이 나타나는 경우 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자 또는 경험자, 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식 경험자, 만 3개월 미만의 영아 및 만 2세 미만의 소아, 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 꼭 필요한 경우의 만 2세 미만의 소아, 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이, 알레르기 체질, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 슈도에페드린 성분과 관련하여 급격한 복통, 직장 출혈 등의 허혈성 대장염의 증상이 발현될 경우, 약에 의한 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등의 알레르기 증상 경험자, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약을 복용하기 전에 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장, 배뇨곤란 등이 있는 사람, 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람, 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 및 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침이 있는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않

을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 장기간 계속 복용하지 마십시오. 복용하는 동안 졸음이 올 수 있습니다. 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작은 피하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하는 동안 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멀미약, 알레르기용약)을 복용하지 마십시오. 우울증, 파킨슨병 치료 등에 사용되는 MAO 억제제를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등을 투여받고 있는 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여받는 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 복용 중 음주하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

발진 및 발적, 가려움, 구역 및 구토, 식욕부진, 변비, 부종, 배뇨곤란, (지속적이거나 심한) 목마름, 어지러움, 불안, 떨림, 불면 등이 나타나는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 드물게 복용 후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은 땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있는 쇽 (아낙필락시스) 혹은 피부점막안증후군 (스티븐스-존슨증후군), 독성표피괴사용해 (리엘증후군), 천식이나 전신의 나른함, 황달 등의 간기능장애, 간질성폐렴 또는 갑작스러운 심한 두통, 번개두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등의 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군의 증상 등이 나타나는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.