

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 2정씩, 1일 3회 매 식간 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

만 15세 미만 소아, 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인, 투석요법을 받고 있는 환자, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 이 약 성분에 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등) 경험자, 신장장애, 간장애, 인산염 저하가 있는 환자, 혈압이 높은 환자 또는 고령자, 심장 장애, 부종(부기) 환자, 신장병 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오. 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

위장진통, 진경제와 함께 복용하지 마십시오. 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 함께 복용시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

알레르기 증상(발진, 가려움 등), 드물게 동계, 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 변비, 또는 입이 마르는 증상, 심계항진(두근거림), GOT, GPT 상승, 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통, 위알도스테론증(저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등), 근병증(무력감, 사지경련, 마비 등) 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.