

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 육체피로, 임신 및 수유기, 병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력 저하 시, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급에 사용됩니다. 이 약은 함유된 비타민 등을 통해 신경통, 근육통, 요통이나 어깨 결림 등의 관절통 증상의 완화 및, 눈의 건조함의 완화, 야맹증, 뼈나 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로에 사용됩니다. 이 약은 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료에 사용됩니다. 이 약은 아연의 보급에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

만 12세 이상 및 성인은 1회 1정씩, 1일 1회 식후 복용합니다.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

임부가 비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 복용 시 선천성 기형을 일으킬 수 있습니다. 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 복용하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만 6세 이하의 어린이가 이 약을 사고로 과량 복용할 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있습니다.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증 환자, 만 12개월 미만의 젖먹이, 고칼슘혈증, 고칼륨혈증, 유육종증, 신장질환 환자, 월슨병, 혈색소증, 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈, 신장결석 환자, 심한 증상의 신부전 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아, 황색4호 타르트라진 과민증 환자 또는 경험자, 고옥살산뇨증 환자, 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자, 심장 및 순환기계기능 장애, 신장장애 환자, 저단백혈증 환자, 담낭관련 질환 및 간질환 환자, 알칼리증 환자, 통풍환자, 신장결석 환자 또는 경험자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 혈전성 소인이 있는 환자, 폴산이 부족한 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급됩니다. 보조요법의 용량이 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 하십시오. 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있으며, 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다. 정해진 용법과 용량을 잘 지키십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

이 약을 복용하는 동안 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파 등을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 강심배당체를 투여 중인 환자는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 땀은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 두드러기, 광선과민반응, 복부 및 위통증, 경련, 열, 혼수, 붉은 반점, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 피부염, 땀이나 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종 등이 나타나는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아지거나 출혈이 오래 지속되는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.