

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 감기로 인한 발열 및 통증, 치통, 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 관절통, 류마티스성 통증에 사용합니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

성인은 1회 1~2정씩, 1일 3회 공복을 피하여 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 하십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

매일 세잔 이상 정기적 음주자가 이 약 또는 다른 해열진통제를 복용할 때는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

이 약에 과민증(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 후두, 눈꺼풀, 입술 등의 부기) 환자 및 경험자, 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제(비스테로이드소염진통제), 감기약 복용시 천식발작 유발 또는 경험자, 소화성 궤양, 심한 혈액 이상, 간장애, 신장장애, 심장기능저하, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 간장애, 신장장애 또는 경험자, 소화성궤양 경험자, 혈액이상 또는 경험자, 출혈경향, 심장기능이상 이 있는 환자, 과민증 경험자, 기관지 천식 환자, 노인, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 황색4호·타르트라진 과민증 환자 또는 알레르기 반응 경험자, 소아는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 소아 및 노인은 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의하십시오. 의사 또는 약사의 지시 없이 통증에는 성인은 10일 이상, 소아는 5일 이상 복용하지 않고, 발열에는 3일 이상 복용하지 마십시오. 특히 고열을 수반하는 소아 및 노인 또는 소모성 질환 환자의 경우 복용 후의 상태를 충분히 살피십시오. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타나는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제, 알코올, 다른 소염진통제와 함께 복용하지 마십시오. 와르파린, 리튬, 티아자이드계 이뇨제, 플루클록사실린과 함께 복용 시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000 mg)을 초과하여 복용하지 마십시오. 간손상을 일으킬 수 있습니다. 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

쇼크 증상(호흡곤란, 온몸이 붉어짐, 혈관부기, 두드러기), 천식발작, 혈소판 감소, 과립구 감소, 용혈성(적혈구 파괴성)빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하(출혈시간 연장), 청색증, 얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저혈압, 쇼크, 구역, 구토, 식욕부진, 발진, 알레르기 반응, 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 독성 표피괴사용해(리엘증후군), 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우, 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨), 간질성폐렴(기침을 동반, 숨이 참, 호흡곤란, 발열), 고음이온차 대사성 산증, AST 상승, ALT 상승, 고정발진 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.