

e약은요 정보

이 약의 효능은 무엇입니까?

이 약은 눈의 가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구멍)의 가려움, 재채기, 코막힘 및 부비동 울혈의 일시적 완화에 사용됩니다.

이 약은 어떻게 사용합니까?

2~6세(11~21kg)은 1회 5mL(1티스푼), 6~12세(22~43kg)은 1회 10mL(2티스푼), 12세~성인(44kg 이상)은 1회 20mL(4티스푼)씩 4~6시간 마다 복용하고, 24시간 동안 4회를 넘지 않습니다.

만 2세 미만에게 투여하지 마십시오. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

이 약을 사용하기 전에 반드시 알아야 할 내용은 무엇입니까?

급성전신발진고름물집증과 같은 중증 피부 이상반응이 나타나는 경우 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이 약은 체내에서 페닐알라닌으로 대사되는 아스파탐이 함유되어, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 페닐케톤뇨증 환자는 복용하지 마십시오.

이 약의 사용상 주의사항은 무엇입니까?

모노아민옥시다아제 억제제(MAOI-우울증, 정신 및 감정장애, 파킨슨병 치료제 중 일부)를 투여 중이거나 투여를 중지한지 2주 이내인 사람, 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자, 만 2세 미만 소아는 이 약을 복용하지 마십시오. 이 약을 복용하기 전에 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 녹내장, 또는 천식이나 만성기관지염과 같은 호흡 장애가 있는 사람, 진정제 또는 신경안정제를 복용 중인 사람은 의사 또는 약사와 상의하십시오. 권장량을 초과하지 마십시오. 이 약 복용 후 졸음이 나타날 수 있으니 주의하십시오. 7일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약을 사용하는 동안 주의해야 할 약 또는 음식은 무엇입니까?

진정제 및 신경안정제와 함께 복용하지 마십시오.

이 약은 어떤 이상반응이 나타날 수 있습니까?

인후(목구멍)통이 2일 이상 지속되거나 두통, 발열, 발진, 구역 또는 구토, 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응, 불안, 어지러움 또는 불면증, 허혈성 대장

염(급격한 복통, 직장 출혈 등), 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군 증상(갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등) 등이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

이 약은 어떻게 보관해야 합니까?

습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.