

전문의약품

다이크로질정

(히드로클로로티아지드)

분류번호 : 213(이뇨제)

다이크로질은 본태성고혈압, 신성고혈압 및 심장성부종, 신성부종 등 각종 부종에 효과가 있는 이뇨제로서 신체내 전해질을 정상적으로 유지시키면서 혈압강하작용을 나타내므로 정상혈압에는 거의 영향을 주지 않습니다.

【성분·함량】 1정 중
히드로클로로티아지드(Hydrochlorothiazide) (KP).....25mg
첨가제 (타르색소) : 황색5호

【성상】 등황색의 원형정제

앞면	뒷면	측면
		

【효능·효과】 고혈압(본태성, 신성 등), 악성고혈압, 심성부종(울혈성 심부전), 신성부종, 간성부종, 월경전긴장증에 의한 부종, 부신피질호르몬, 폐질부타존, 에스트로겐에 의한 부종

【용법·용량】

- 성인
 - 1. 부종 : 히드로클로로티아지드로서 1회 1~4정 (25~100mg)을 1일 1~2회 경구투여합니다.
 - 2. 고혈압 : 이 약으로서 1일 1~2정 (25~50mg)을 1~2회 분할 투여합니다. 다만, 악성고혈압의 경우에는 보통 다른 혈압강화제와 병용투여합니다.
 - 3. 월경전긴장증 : 이 약으로서 1회 1~2정 (25~50mg)을 1일 1~2회 투여합니다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 중증의 간기능장애 환자
 - 2) 무뇨 환자
 - 3) 급성 또는 중증의 신부전 환자
 - 4) 저나트륨·저칼륨혈증 환자
 - 5) 치아잇게 이뇨제 및 그 유사화합물(설펜아미드계)에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
 - 6) 애디슨병 환자
 - 7) 고칼슘혈증 환자
 - 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자는 복용하지 마십시오.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 이 약을 복용하는 환자
 - 2) 디기탈리스, 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬의 투여를 받고 있는 환자
 - 3) 간질환·간기능장애 환자
 - 4) 진행성 간경변 환자(간성 혼수가 나타날 수 있습니다.)
 - 5) 심한 관동맥경화증 또는 뇌동맥경화증 환자(급격한 이뇨가 나타날 경우, 급속한 혈장량 감소로 혈액농축을 일으켜 혈전색전증이 나타날 수 있습니다)
 - 6) 부갑상선기능항진증 환자
 - 7) 염제한요법 환자
 - 8) 교감신경절제후의 환자(이 약의 혈압강하작용이 증가할 수 있습니다)
 - 9) 설사, 구토 환자
 - 10) 고령자
 - 11) 영아(전해질평형실조가 나타나기 쉽습니다)
 - 12) 본인 또는 양친이나 형제에 통풍이나 당뇨병이 있는 환자
- 부작용
 - 1) 대사 : 저칼륨혈증, 저나트륨혈증, 저마그네슘혈증, 저염소혈증성 알칼리증, 고칼슘혈증 등의 전해질평형실조가 나타날 수 있으므로 신중히 투여합니다. 또한 고나산혈증, 고혈당증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정될 경우에는 감량 또는 휴약 등의 적절한 처치를 합니다. 또한 통풍, 콜레스테롤·중성 지방 상승이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 혈액 : 드물게 혈소판감소, 백혈구감소, 재생불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 자반 등의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 구갈, 복부불쾌감, 변비, 복부선통, 췌장염, 설사, 타액선염, 구강건조, 변비 드물게 위통 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 정신신경계 : 어지러움, 두통, 피로, 졸음, 감정둔마 등이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 호흡기계 : 드물게 간질성 폐렴, 폐부종이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 6) 순환기계 : 심계항진, 때때로 기립성 저혈압, 드물게 부정맥 등이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 눈 : 드물게 일시적 시력불선명, 황시 등의 시력장애가 나타날 수 있습니다.
 - 8) 간장 : 드물게 황달, 간염, 급성 담낭염이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 과민증 : 과사성 혈관염, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 안면홍조, 광과민증, 아나필락시스 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.

- 10) 신장 : BUN : 크레아티닌 상승, 급성 신부전, 간질성 신염 등이 나타날 수 있습니다.
- 11) 기타 : 때때로 권태감, 코막힘, 발기부전, 드물게 전신성 홍반성 루푸스(SLE)의 악화, 고칼슘혈증 등을 유발하는 부갑상선장애, 근경련이 나타날 수 있습니다. 또한 감각이상도 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약의 이뇨효과는 급격히 나타날 수 있으므로 전해질평형실조, 탈수에 특히 주의하고 저용량에서 투여를 시작하여 천천히 증량합니다.
- 2) 복용하는 경우에는 전해질평형실조가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사합니다.
- 3) 혈압강하작용에 의해 어지러움이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

5. 상호작용

- 1) 다른 이뇨제(푸로세미드)와 테르페나딘의 병용투여시 QT 연장, 심실성 부정맥을 일으켰다는 보고가 있으므로 이 약과 테르페나딘을 병용투여 하지 않습니다. 또한, 이 약과 아스테미졸의 병용투여시 QT 연장, 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로 병용투여 하지 않습니다.
 - 2) 이 약은 노르에피네프린 등의 혈압상승성 아민에 대한 혈관벽의 반응성을 감소시키고 투보쿠라린 및 그 유사화합물의 마비작용을 증가시킨다는 보고가 있으므로 수술전의 환자에게 이 약을 투여하고 있을 경우에는 일시적으로 투여를 중지하는 등 주의합니다.
 - 3) 바르비탈계 약물, 아편 알칼로이드계 마약과의 병용 또는 음주에 의해 기립성 저혈압이 증가되었다는 보고가 있습니다.
 - 4) 혈압강화제 (다른 이뇨제, 마취제, 알코올) 등의 작용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 ACE 저해제와 병용투여하는 경우에는 혈압강하작용을 증가시킬 수 있으므로 주의합니다.
 - 5) 당질부신피질호르몬 또는 부신피질자극호르몬을 병용투여하는 경우에는 칼륨의 방출이 증가될 수 있으므로 신중히 투여합니다.
 - 6) 이 약 투여중 혈압강화제의 작용이 현저히 감소될 수 있으므로 주의합니다.
 - 7) 디기탈리스의 심장에 대한 작용을 증가시킬 수 있으므로 병용투여하는 경우에는 신중히 투여 합니다.
 - 8) 신장을 통한 리튬 배설이 감소되어 리튬에 의한 심독성 및 신경독성이 증가될 수 있으므로 신중히 모니터 하고 용량을 조절합니다.
 - 9) 콜레스티라민, 콜레스티폴을 병용투여하는 경우에는 치아잇게 이뇨제의 흡수가 저해될 수 있습니다.
 - 10) 비스테로이드성 소염진통제(인도메타신 등)와 병용투여하는 경우에는 치아잇게 이뇨제의 작용이 감소될 수 있습니다.
 - 11) 염화칼륨을 병용투여하는 경우에는 이 약에 의해 소장궤양 또는 혈착이 나타날 수 있으므로 주의합니다.
 - 12) 고용량의 살리실산계 약물과 병용투여하는 경우에는 중추신경계에 대한 살리실산계 약물의 작용이 증가될 수 있습니다.
 - 13) 하제와 병용투여하는 경우에는 칼륨방출을 증가시킬 수 있습니다.
 - 14) 부정맥용제인 퀴니딘과 병용투여하는 경우에는 퀴니딘의 배설이 감소될 수 있습니다.
 - 15) 빈카민, 에리스로마이신IV, 설토프라미드와 병용투여하는 경우에는 중증의 저칼륨혈증과 서맥이 나타날 수 있으므로 병용 투여를 피합니다.
 - 16) 메트포르민에 의한 젖산혈증의 위험이 있으므로 혈중크레아티닌치가 남성 1.5mg/dL 이상, 여성 1.2mg/dL 이상일 경우에는 메트포르민과 이 약을 병용투여하지 않습니다.
 - 17) 이뇨제에 의한 체액감소 환자에게 요오드함유물질을 병용투여하는 경우에는 투여전에 수분을 공급합니다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 치아잇게 이뇨제는 신생아 또는 영아에서 고빌리루빈혈증, 혈소판감소 등을 일으킬 수 있습니다. 또한, 이뇨효과에 의해 혈장량 감소, 혈액농축, 자궁·태반혈류량 감소가 나타날 수 있으므로 임신 후기에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 이 약은 모유 생성을 억제하고 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다.
7. 소아에 대한 투여
- 영아는 전해질평형실조가 나타나기 쉬우므로 신중히 투여합니다.
8. 고령자에 대한 투여
- 고령자에는 다음 사항을 주의하여 저용량에서 투여를 시작하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여합니다.
- 1) 고령자에서의 급격한 이뇨는 혈장량의 감소를 초래하므로 탈수, 저혈압 등에 의한 기립성 조절장애, 어지러움, 실신 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 특히 심질환 환자 중 부종이 있는 고령자에서의 급격한 이뇨는 급속한 혈장량감소·혈액농축을 초래하여 뇌경색 등의 혈전색전증이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 일반적으로 고령자에서의 과도한 혈압강하는 바람직하지 않습니다(뇌경색이 나타날 수 있습니다.).
 - 4) 고령자에서는 저나트륨혈증, 저칼륨혈증이 나타나기 쉽습니다.
9. 임상검사치에의 영향
- 갑상선장애가 없는 환자의 혈청 단백질결합요오드(PBI)를 저하시킬 수 있습니다.
10. 기타
- 야간에는 휴식이 필요한 환자는 야간에 배뇨를 피하기 위하여 오전중에 투여하는 것이 바람직합니다.

【저장방법】 실온(1~30℃)보관, 건조, 밀폐용기

※ 보관 중 인습되어 잘 부서질 수 있으니 정제를 꺼낸 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관하시기 바랍니다.

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 1000정

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 “소비자 분쟁 해결 기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안개정년월일 2009. 11. 7
제품의 사용기한은 외부포장에 표기



제조판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공 장 : 충북 청원군 오창읍 양정리 907-1
www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신 자료료 부담)