●효과빠른 종합감기약

분류번호 : 114

일 반 의 약 품

노바 캅셀

Nova Cap.

감기에 걸리면 콧물이 나고, 기침, 가래가 나오며 인후통, 발열 등 불쾌한 증상에 시달리게 됩니다. 이러한 증상이 악화되면 기관지염, 축농증 등의 합병증을 일으키게 되므로 반드시 증상이 가벼운 초기에 치료를 해주어야 합니다.
「노바」 캅셀은 6가지 성분이 합리적으로 복합처방되어 있어 감기의 제증상을 신속하게 완화시켜주는 종합감기약 입니다.

■원료약품의 분량 : 1캅셀 중

아세트아미노펜(약전)	200mg
에텐자미드(약전)	120mg
노스카핀(약전)	10mg
디엘염산메칠에페드린(약전)	15mg
디엘말레인산클로르페니라민(약전)	2.5mg
무수카페인(약전)	40mg

■성　　상 : 백색의 분말이 충전된 상부 주황색, 하부 무색투명한 경질캅셀제

■약리작용

「노바」캅셀은 아래의 6가지 성분이 각각의 약리작용을 서로 도와가며 내므로 감기의 제증상을 신속히 완화시켜줍니다.

1. ~~아세트아미노펜은 부작용이 적은 진통성분으로 해열, 두통, 근육통 등을 없애줍니다.~~
2. 에텐자미드는 살리실산계열의 NSAIDs로 아세트아미노펜과 함께 진통효능을 효과적으로 나타내며 소염작용도 나타냅니다.
3. 말레인산클로르페니라민은 감기초기의 콧물, 코막힘, 재채기 등을 치료해 줍니다.
4. 노스카핀은 기침중추에 작용하는 진해제로 특히 야간의 심한 기침에 효과적입니다.
5. 디엘염산메칠에페드린은 기관지 확장 및 말초혈관 수축작용으로 발작성의 심한 기침을 멈추어 줍니다.
6. 무수카페인은 뇌혈관에 작용하여 감기로 인한 두통을 완화시켜주며 감기로 인한 무력감을 예방합니다.

■용법 · 용량

성인 1회 1캅셀 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

■효능 · 효과

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀,입술등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 양친, 형제등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유·소아 및 어린이 (14세 이하)
4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압등 병이 있는 사람
5) 심장에 장애가 있는 사람, 또는 고령자
6) 녹내장 (예 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
7) 수유부
8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
1) 용법·용량을 잘 지킬 것
2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담약, 다른감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제등
3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
4) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것
① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
③ 천식이 나타난 경우
6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작은 피할 것
3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
4) 장기 연용하지 말 것
6. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
2) 직사일광을 피하고 될 수 있는한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■**저장방법** : 차광기밀용기

■**사용(유효)기간** : 제조일로부터 48개월

■**포장단위** : 10, 100, 500, 1000 캅셀

※ 엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병·의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. DK290101

동광제약주식회사
경기도 평택시 모곡동 439-1

KGMP 적격업체제품
본 제품은 우수의약품 제조관리기준에 적합하게 제조되었습니다.