

의약품 분류번호	331
	혈액대용제

중외염화나트륨주사액
 (117mg/1mL)

NaCl
 (117mg/1mL)



전문의약품

□ 원료약품의 분량

1mL중	
염화나트륨(KP).....	0.117g
주사용수(KP)	적량

□ 성 상

무색의 맑은 용액이 무색투명한 유리용기 또는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 다층필름 플라스틱용기에 든 주사제입니다.

□ 약리작용

Na는 혈청의 무기 성분 중 90% 이상을 차지하고 있어, 세포외액의 침투압 유지에 중요한 인자입니다. 정상인에서 혈청 Na⁺ 농도는 뇌하수체 -- 부신계, 용적수용체나 신장에 의해 미소하게 조절할 수 있지만, 부신기능 부전, 염류 상실성 신염, 혹은 이뇨제 투여 등에 의해 저 Na 혈증이 나타납니다.

□ 효능·효과

전해질 보액의 전해질 보정(저나트륨혈증, 저염소혈증)

□ 용법·용량

체내의 수분과 전해질의 부족한 정도에 따라 전해질 보액에 첨가하여 사용합니다.

□ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 고나트륨혈증 환자
- 2) 수분과다상태 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 순환기계기능장애 환자
- 2) 신장에 환자
- 3) 저단백혈증 환자
- 4) 저나트륨혈증(120mmol/L 미만) 환자
- 5) 저칼륨혈증 환자
- 6) 고염소혈증 환자

3. 이상반응

대량·급속투여에 의해 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종, 산증, 혈청전해질 이상이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

지속되는 비경구 치료동안 또는 환자 평가의 근거로 임상적 평가와 주기적인 실험실적 평가는 체액 평형, 전해질농도, 산염기 평형의 변화를 모니터링하는데 필요합니다.

5. 적용상의 주의

이 약은 다른 전해질 보액에 희석해서만 사용하고 단독으로는 사용하지 않아야 합니다.

□ 포장 단위

20mL, 100mL × 자사포장단위

□ 저장 방법

밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

□ 교환 및 제품문의

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

연락처 : 고객센터 1588-2675



첨부문서 작성년월일 : 2011. 5. 2 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.



jw 중외제약
 제이더블유중외제약(주)
 경기도 화성시 안성동 146-141