

소화성 궤양치료제

# 아루사루민<sup>®</sup>정

(수크랄페이트)

일반의약품

1000정

## ULCERLMIN<sup>®</sup>tab.

의 약 품  
분류번호

232

소화성궤양용제

- **원료약품의 분량** : 1정 중 : 수크랄페이트(USP).....250mg
- **성상** : 백색의 정제
- **효능·효과** : 1. 주효능 효과 : ① 위산과다, 위·십이지장궤양 ② 다음 질환의 위점막 병변(미란(자두름), 출혈, 발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기))의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기  
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다. : 역류성 식도염
- **용법·용량** : 성인 : 수크랄페이트로서 1회 1g 1일 3회 식전 1시간에 경구투여(복용)하십시오. 역류성식도염에는 1회 1g 1일 4회 식전 1시간 및 취침시에 투여하십시오. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
- **사용상의 주의사항** : 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. : 투석요법을 받고 있는 환자  
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. : 신장장애(신장장애) 환자 (장기투여에 의해 알루미늄 뇌증, 알루미늄 골증이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정하십시오.)  
3. 부작용 : ① 소화기계 : 때때로 변비, 구갈(목마름), 구역, 드물게 설사, 구토, 소화불량, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부 : 드물게 가려움증, 발진이 나타날 수 있습니다. ③ 신경계 : 드물게 졸음, 현기가 나타날 수 있습니다. ④ 기타 : 드물게 요통, 두통이 나타날 수 있으며 과민반응(두드러기, 혈관 부종(부기), 호흡곤란, 비염(코염) 등)의 보고가 있습니다.

4. 상호작용 : ① 뉴퀴놀론계 항균제(염산시프로플록사신, 노르플록사신 등), 시메티딘, 라니티딘, 디곡신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오필린 등과 동시에 복용함으로써 병용(함께 복용)약제의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)약제 투여 후 가급적 2시간 이상 시간 간격을 두고 투여하십시오. ② 이 약 투여에 의해 병용(함께 복용)하는 약제의 흡수·배설에 영향을 줄 위험이 있으므로 신중히 투여하십시오.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여 : ① 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오. ② 이 약이 모유 중으로 분비되는지 알려지지 않았으나, 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.
6. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않습니다.
7. 일반적 주의 : ① 장기연용(계속 복용)을 하지 마십시오. ② 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ **포장단위** : 1000정

■ **교환 및 제품문의** : 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·부패 또는 오손된 제품등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오. 연락처 : 고객센터팀 1588-2675



첨부문서 작성년월일 : 2011. 5. 2 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지([www.jw-pharma.co.kr](http://www.jw-pharma.co.kr))에서 확인할 수 있습니다.

사용기한 :

제조번호 :

제조판매원

**jw 중외제약**

제이더블유중외제약(주)

충남 당진군 송악읍 한진리 416-1

원료공급원(일본)

**CHUGAI**

CHUGAI

PHARMACEUTICAL CO., LTD.



PP

캡:LDPE  
라벨:종이

아루사루민정라벨-1105-G