전문의약품

KGMP 적격업체 제품

뇌세포 대사 개선제

에르덜진® 정

에르고로이드 메실레이트

뇌신경, 세포는 40대 이후부터 사멸되기 시작하므로 기억력 저하, 사고력의 둔화, 두통 등의 증상들이 현저히 나타나게 되며, 이와 같은 뇌세포사멸의 직접적인 원인은 노화 및 뇌세포 대사의 장애로 밝혀졌습니다.
에르덜진은 뇌세포 대사에 필수적인 효소들을 정상화시켜 ATP와 c-AMP를 균형있게 공급함으로써, 저하된 뇌세포 기능을 활성화시킵니다.
또한 **에르덜진**은 선택적인 교감신경 차단 작용이 있으며 뇌신경 전달물질(예 : 세로토닌, 도파민)의 전달기전을 정상화 시켜주므로 기억력 감퇴, 두중, 어지러움 등 노화에 따른 임상적 제증상을 개선시킵니다.

■ **원료약품의 분량 :** 1정 중
에르고로이드 메실레이트(USP)..... 1mg
1.5mg

성상 : 백색의 원형정제

■ **효능 · 효과**

1. 다음 질환에 의한 여러 증상의 개선 : 뇌동맥경화증, 두부외상후유증, 뇌경색후유증, 뇌출혈후유증
2. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 폐색성혈전혈관염(버거병), 폐색성동맥경화증, 동맥색전·혈전증, 레이노병 및 레이노증후군, 말단청색증, 동창·동상, 간헐성파행
3. 고혈압(이 약의 혈압강하작용은 완만하므로 고혈압 환자에 투여할 경우에는 다음에 한합니다.) : 고령자, 뇌동맥경화증 또는 뇌졸중후유증을 수반한 환자에 사용할 경우, 이뇨제 투여로 혈압강하작용이 나타나지 않는 환자에 병용투여하는 경우
4. 노화에 의한 치매성증상 : 어지러움, 두통, 정신집중곤란, 지남력상실, 기억력 장애, 적극성결핍, 우울, 사회성결여, 일상활동 및 자기보호의 곤란

■ **용법 · 용량**

성인 : 메실산에르고로이드로서 1회 1~2mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이 약 또는 맥각알칼로이드에 과민증의 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.
   1) 현저한 서맥 환자
   2) 정신병 환자
   3) 비경구적 투여의 경우는 혈압을 떨어뜨릴 수 있으므로 혈압을 체크해야 합니다.
3. 부작용
   1) 순환기계 : 서맥, 때때로 혈압강하, 뇌빈혈양 증상, 안면홍조, 흥분, 심계항진, 저혈압 환자에서 기립성 저혈압이 나타날 수 있습니다.
   2) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
   3) 정신신경계 : 때때로 두통, 두중, 어지러움, 불면, 드물게 졸음, 손발저림증상이 나타날 수 있습니다.
   4) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 변비, 복통, 식욕부진, 구갈, 드물게 구내염이 나타날 수 있습니다. 구역과 구토는 음식물과 함께 복용시 예방될 수 있습니다.
   5) 간장 : 드물게 AST, ALT, ALP의 상승이 나타날 수 있습니다.
   6) 기타 : 때때로 혀아림, 혀의 거칠어짐, 혀의 꼬임, 흉부불쾌감, 드물게 심와부통, 발한이상, 시력불선명 등의 시각장애, 코막힘, 이명이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

1) 항응고제, 혈압강하제와 병용투여시 작용이 증가될 수 있습니다.

2) 다른 맥각알칼로이드와 병용투여시 부작용이 증가될 수 있습니다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

2) 유즙분비를 억제할 수 있으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.
(사용경험이 적거나 없음.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으

므로 감량하는 등 주의합니다.

8. 과량투여
과량 투여시의 증상과 징후는 보고된 바 없습니다.

■ **저장방법 :** 기밀용기, 실온보존

■ **포장단위**

에르덜진 정 1mg ····· 100, 1000정
1.5mg ····· 100, 1000정

Ⓡ = 등록상표

※ 본 제품은 GMP규정에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
사용기한의 경과, 변질, 변패, 오손, 또는 파손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.

■ **제품문의처 :** 개발실 (02)405-3000

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 (2003년 5월) 이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 02-405-3000(개발실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일자 : 2003. 5
인 쇄 일 자 : 2004. 5

제조발매원
환인제약주식회사
경기도 안성시 신소현동 150