에로딘정

500정

KGMP 적격업소

일반의약품
분류번호:141

에로딘정은 비충혈제거제인 염산슈도에페드린과 항히스타민제인 염산트리프롤리딘의 2가지 성분이 복합되어 있는 제제로 알레르기성, 혈관운동성비염이나 감기의 콧물, 코막힘 등의 증상을 완화시킵니다.

제조·발매원

SUDO 수도약품공업주식회사

본사·공장:경기도 화성시 향남면 상신리 902-5

서울:서울시 서초구 서초동 1599-11(전화)582-4211

【원료약품의 분량】 1정 중

염산슈도에페드린(B.P.)……60mg

염산트리프롤리딘(B.P.)……2.5mg

【성　　상】

백색의 원형정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인 : 1회 1정

소아(8~14세) : 1회 1/2정

1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 중증의 간 및 신기능 장애 환자
   3) 중증의 관상 심장 질환 환자
   4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨장애 환자
   5) 고혈압 환자
   6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   7) 2세 이하의 영아
   8) MAO 저해제를 투여중인 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 천식 환자
   2) 녹내장 환자
   3) 고혈압 및 관상동맥질환 환자
   4) 심질환 및 부정맥 환자
   5) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
   6) 전립선 비대로 인한 배뇨곤란 환자
   7) 7세 이하의 소아
3. 부작용
   1) 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한, 경미한 혈압강하, 시력장애, 산동, 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직, 아테토시스, 간대성 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있다.
   2) 과 민 증 : 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감이 나타날 수 있다.
   3) 소화기계 : 구갈, 구역, 구토가 나타날 수 있다.
   4) 비뇨기계 : 배뇨곤란이 나타날 수 있다.
   5) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.
   2) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
   3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령 이외의 소아에게는 투여하지 않는다.
5. 상호작용
   혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제와 병용투여하지 않는다. MAO저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제 투여 최소 15일후 이 약을 투여한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않는다.
   2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는다.
7. 소아에 대한 투여
   소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.
8. 과량투여시의 처치
   과량투여시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.
9. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 될수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 지사포장단위

【저장방법】 기밀용기

※본 제품이 유효기한 또는 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

ero 101001

PP 분리배출

제조번호:

사용기한:

8 809018 301039