K.G.M.
우수의약품지정업체

빠르고 신속한 소염진통제

비올라정

(클로닉신리지네이트)

일반의약품	
분류번호	114

【원료약품의 분량】 1정 중
클로닉신리지네이트(식품의약품안전청고시)·····125mg

【성　　상】 원형정제로 파란색의 필름코팅정제

【효능 · 효과】
다음 질환에 사용할수 있다.
류마티양 관절염, 근육통, 외상후 · 수술후 동통, 신경통, 두통, 치통, 이통, 월경통

【용법 · 용량】
성인 : 클로닉신리진으로서 1회 125~250mg을 1일 3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말것.
   1) 소화성궤양환자
   2) 이 약에 과민증 환자
   3) 임부
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   소화성궤양의 병력이 있는 환자
3. 부작용
   1) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
   2) 기　타 : 때때로 구역, 현기증, 졸음, 두통, 식은땀, 한기, 다행증이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
      (2) 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      (2) 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
      (3) 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
5. 상호작용
   이 약은 혈액응고에 영향을 주지 않으므로 혈액응고와 관련한 용량조절은 필요하지 않다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

※본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(K.G.M.P.)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※이 약을 사용하기전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.

http://www.bi-nex.com
☎ 080-263-3151

개정년월일 2004. 05. 14

Binex (주)바이넥스
서울시 영등포구 영등포동 1가 92-2
공장 : 부산시 사하구 장림동 480-2