

간장질환 보조치료제

삼진 제테파 캡슐

일반의약품
분류번호 391
KGMP
적격업체제출

SAMJINJETEPAR® Capsule

간장 질환을 성공적으로 치료하기 위해서는 과도한 독성물질을 제거하거나 손상된 해독기전을 약물학적으로 치료하여야 합니다. 과다한 독성물질을 제거한다는 것이 질병치료에 접근하는 것은 분명하지만 그것이 항상 가능한 것은 아니며 특히 독성 물질이 내인성인 경우는 독성과다, 간기능부전, 간손상, 독성과다 증가의 악순환을 차단하는 것이 중요합니다.

삼진제테파®캡슐은 해독작용에 필요한 ①독성물질의 포합체 형성을 위한 기질 ② 지방 청정인자 ③촉매 ④에너지를 동시에 공급하는 다중요법으로 간장질환을 보조 치료합니다.

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중

글루쿠론산베타인(KPC)	150mg
글루쿠론산디에탄올아민(KPC)	30mg
아스코르빈산니코틴아미드(KPC)	20mg
(총 글루쿠론산으로서 113mg, 아스코르빈산으로서 11.8mg, 니코틴산아미드로서 8.2mg)	

■ 성 상 : 갈색의 가루 또는 과립상이 든 상 · 하 자주색의 캡슐제

■ 약리작용

1. glucuronconjugation은 해독기전의 중요한 단계인데 **삼진제테파®캡슐**은 이 단계의 가장 이상적인 기질로서 우선적으로 해독경로에 들어가 화학에너지를 절약합니다.
2. 간기능부전은 보통 간장의 지방침윤과 관련되며 이것은 간기능에 나쁜 영향을 끼칩니다. **삼진제테파®캡슐**은 Choline의 생물학적 활성형으로서 지방을 에너지 생산을 위한 연료로 사용되도록 하고, 인지질 및 lipoprotein으로 전환하여 간을 지방 침윤으로부터 보호합니다.
3. 독성물질을 포합체 형성이 용이한 물질로 전환하는 것은 보통 산화적 과정으로서 에너지와 촉매를 필요로 하며 이 전환에 뒤따르는 glucuronconjugation 또한 에너지를 요구하는 과정입니다. **삼진제테파®캡슐**은 ATP, UTP, NADH등과 같은 화학에너지 공급체를 합성하는 신화 · 환원 반응의 촉매로서 중요한 역할을 합니다.
4. **삼진제테파®캡슐**은 phospholipid-ethanolamine-glyceride의 한 성분인 ethanolamine의 합성에 쓰임으로서 phospholipid pathway로 지방을 유도하여 간장으로부터 지방의 제거를 돕습니다. 더 나아가 **삼진제테파®캡슐**은 중위의 에너지 전달체로 작용하여 해독에 관여된 화학반응에서 고위의 에너지 전달체를 돕습니다.

■ 효능 · 효과 : 다음 질환의 치료 보조 : 급 · 만성 간질환, 독성간질환

■ 용법 · 용량 : 성인 : 1회 2캡슐, 1일 2~3회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 성분에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
 - 2) 어린이가 복용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 차광기밀용기(냉암소에 보관)

■ 포장단위 : 100, 120캡슐

※ 주의

1. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 3. PTP포장의 경우, PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 11월 7일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

®=등록상표

10009

ZT-03-06-1171

제조판매원
SAMJIN 삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-2
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6

기술제휴 및 원료공급원
ROTTAPHARM, Italy