

Vermiflu[®] 1Tab.

- 성분·함량: 1정중
플루벤다졸(식품의약품청고시) 500mg
- 효능·효과: 회충, 요충, 편충, 십이지장충의 감염 및 이들 혼합 감염의 구제
- 용법·용량: 성인·소아 구별없이 1일 1회 1정 복용
- 저장방법: 밀폐용기, 실온보관
- 성상: 얇은 황백색의 원형정제

01-31

1정

1 정 1 회 광범위 구충제
버미플루[®] 정

플루벤다졸 500mg



신동제약주식회사

경기도 안산시 일대동 434-4



8 806103 873877

버미플루정은 장내에 기생하고 있는 기생충에 대하여 광범위하게 작용하는 플루벤다졸을 주성분으로 한 광범위 구충제로서 1일 1회 1정 복용으로 성충은 물론 유충, 충란까지 사멸시켜 타 구충제보다 편리하고 효과적입니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 임부
 - 2) 이 약에 과민반응을 나타낸 병력이 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 기생충의 대량감염시 또는 기생충의 배출시 일과성 복통, 설사가 드물게 보고되었습니다.
 - 2) 드물게 피진, 발진, 담마진, 혈관부종과 같은 과민반응이 관찰되었습니다.
3. 1세미만의 소아에 대한 투여

1세 미만의 소아에 대해서는 적절한 대조시험이 행해진 바 없으므로, 기생충 감염이 영양상태나 신체 발육을 저해하는 경우에 한하여 이 약을 투여합니다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 랫트를 사용한 한 시험에서 태자독성 및 최기형성 작용이 관찰되었습니다. 그러나 여타의 랫트에 대한 시험이나 마우스, 토끼를 사용한 최기형성 시험에서는 별다른 변화가 관찰되지 않았습니다. 인체에 대한 사용경험으로 볼 때 이약이 최기형의 위험성을 증가시키는 것으로 나타나지는 않으나 임부 및 임신 가능성이 있는 부인에는 이 약을 투여하지 않도록 하십시오.
 - 2) 이 약의 모유중으로의 이행에 관해서는 알려진 바가 없으나, 이 약 투여시에는 수유를 중단하는 것이 좋습니다.
5. 과량투여

과량투여시에는 복부경련, 구역, 구토 및 설사가 나타날 수 있습니다.

이 약에서 권장되는 최장치료기간은 3일이나 드물게 포충질환 치료를 위해 장기간 대량투여한 환자에서 가역적인 간기능장애, 간염, 혈액이상 등이 보고되었습니다.

특별한 해독제는 없으며 필요에 따라 20mg/100ml의 과망간산칼륨 수용액으로 위세척하거나 활성탄을 투여합니다.