

HEALTHFUL LIFE  BEAUTIFUL LIFE
MEDICA KOREA

성인병 · 순환기질환 예방 치료제

힘톤-C[®] 연질캡슐

HIMTON-C Soft Cap.

분류번호 : 219



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

힘톤-C는 매우 다양하고 신비로운 작용으로 '21세기의 가장 빛나는 영양원소'로 불리는 셀레늄을 주성분으로 하고, 토코페롤을 배합하여 상승작용을 얻어 국내에 처음으로 셀레늄 제제를 소개한 힘톤의 처방에, 역시 항산화력을 가진 영양물질인 비타민 A와 비타민C를 추가하여, 더욱 강화되고 이상적으로 배합하여 각종 성인병의 예방 및 치료, 순환기 장애의 개선에 매우 유효합니다.

※ 셀레늄은 인체내의 각종 효소, 혈액, 장기조직, 고환, 전립선, 난소, 눈의 수정체 등에 다양하게 분포하며, 정상적인 건강생활에 필수적인 미량 미네랄 원소입니다.(Se. 원자번호 34, 원자량 78.96)

[성분 · 함량] 1캡슐 중

셀레늄함유건조효모(식약청 고시)	92.6mg
(셀레늄으로서 50 μ g)	
초산토코페롤(약전)	400I.U
아스코르빈산(약전)	500mg
팔미틴산레티놀(유. 에스. 피)	5,000I.U
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.59mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.15mg
황색 5호	적량
황색 203호	적량
청색 1호	적량

[성상]

담갈색의 죽상 내용물이 든 일면은 암녹색 일면은 암갈색의 연질캡슐제

[특징]**1. 힘톤-C의 항산화 작용**

세포의 막을 구성하고 있는 불포화지방산이 산화되어 과산화지질로 변화되면, 세포막의 투과성이 약화되고, 이 상태가 진행될수록 세포의 노화현상이 나타나며, 더 나아가 심장질환, 동맥경화, 고혈압, 감염성질환, 관절염, 시력질환 등의 성인병이 발생됩니다.

2. 힘톤-C의 심장기능 및 혈압정상화 작용

셀레늄은 심장, 혈관을 포함하는 인체의 여러 기관의 필수적인 구성 성분으로, 심장근육의 퇴화 및 심장기능부전은 셀레늄의 결핍과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 심장기능부전의 원인이 되는 고혈압도 셀레늄의 보충으로 치료되는데 이는 혈압을 조절하는 호르몬인 Prostaglandin A₂(혈관 확장작용)와 Prostaglandin E₂(혈액응고방지작용)의 구성 성분인 셀레늄에 의하여 이들 호르몬의 생산이 조절되므로 혈압을 정상화시킬 수 있는 것입니다.

따라서 힘톤-C는 심장질환, 고혈압, 동맥경화, 수족냉감 및 저림 등의 순환기장애의 치료 및 예방에 탁월한 효과를 발휘합니다.

3. 힘톤-C와 감염성 질환

감염성 질환의 예방에 대한 연구결과, 셀레늄은 항체의 생산을 대폭 증진시킨다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 면역반응의 증진은 셀레늄과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 따라서 힘톤-C는 각종 감염성 질환에 대한 저항력을 증강시켜 줍니다.

4. 힘톤-C와 관절염

관절염은 발명인자가 다양하고 또한 여러 인자가 복합되어 일어나는 질환입니다. 그러나 셀레늄 과산화지질과 유리기를 분쇄하는 작용으로서 비타민A, C, E가 복합처방될 때 류마티스성 관절염의 치료에 탁월하다고 보고되어 있습니다.(1983. 영국관절염협회). 따라서 힘톤-C는 관절염의 예방과 치료에 매우 효과적입니다.

5. 힘톤-C와 시력질환

동물실험에서 셀레늄 결핍은 수정체내의 GSHpx 농도가 저하되고, GSHpx의 결핍이 지속되면 백내장을 일으킬 수 있으며, 수정체의 광선에 대한 감도에도 영향을 미치는

결과를 나타내었습니다. 또한 시력질환을 앓은 사람의 눈의 수정체는 정상인에 비하여 약 1/6정도의 셀레늄만을 함유하고 있음이 밝혀졌습니다.
힘톤-C는 야맹증, 백내장 등의 시력질환의 발생을 억제합니다.

[효능·효과]

심질환, 고혈압, 감염성 질환 비타민 A 및 C의 보급, 시력질환에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

성인 1일 1회 1캡슐을 식후에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 10,000I.U. 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000I.U./일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A 결핍증 환자는 제외).

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

구성성분에 과민증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

4. 부작용

- 1) 소화기계 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 피부 : 발진, 발적, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 비타민 E를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.
- 3) 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70~150 μ g이고, 200 μ g 이상 투여하면 독성이 나타날 수 있으므로 200 μ g 이상 투여하지 않습니다.

6. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법·용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울입니다.

7. 임상검사치에의 영향

각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기

[포장단위] 자사포장단위

제조회사 : (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 상신리 904-6

제 조 자 : 알앤피코리아(주) 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.co.kr)를 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 본사 마케팅부((02)2025-0247) 또는 개발부((02)2025-0213~5)로 문의바랍니다.

개정일자 : 1997. 2. 15
MK0711286

(주)메디카 코리아

경기도 화성시 향남읍 상신리 904-6