인코라민®정

일반의약품

피로 · 신경통에

작 용 · 특 성 : **인코라민정**은 근육과 신경에 효과적인 활성형 티아민(푸르설티아민)을 비롯하여 비타민 B, C, E가 복합처방된 제제입니다.

●피로

인코라민정은 탄수화물, 단백질, 지질대사 등 각종 생체내 대사를 촉진하여 신체기능을 활성화할 뿐만아니라 근육과 신경에 축적된 피로물질을 분해 · 배설시키므로 피로해소에 효과적입니다.

또한 눈의 신경과 모양체근에 작용하여 눈의 긴장과 피로를 풀어줍니다.

●신경통, 요통, 견통

인코라민정에 함유된 활성형 비타민은 신경기능을 정상적으로 유지시키므로 신경통, 요통, 견통에 효과를 발휘합니다.

●병중 · 병후, 소모성 질환

인코라민정은 비타민 B군 및 비타민 C, E가 상호협력하여 작용하므로 병중 · 병후, 소모성 질환 등에 의해 결핍되기 쉬운 비타민을 효과적으로 공급합니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 :** 매 정당

푸르설티아민(식약청고시)	50mg
리보플라빈(K.P.)	2mg
염산피리독신(K.P.)	2mg
0.1% 시아노코발라민(식약청고시)	5mg
(시아노코발라민으로서 5㎍)	
제피아스코르빈산(별규)	62.5mg
(아스코르빈산으로서 60mg)	
건조초산토코페롤 50%(별규)	100mg
(초산토코페롤로서 50mg)	

2. 성상 : 적색의 장방형 필름코팅정

효 능 · 효 과 : 1. 육체피로시 비타민 B_1, B_2, C, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시 비타민 B_1, B_2, B_6, C 및 노년기의 비타민 E의 보급

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등)
- 각기
- 눈의 피로
- 말초혈행장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림, 수족냉증

용 법 · 용 량 : 성인 1회 1정, 1일 1~2회 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항 :

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자

2) 3개월 미만의 영아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부, 수유부

3. 부작용

1) 이 약 투여에 의하여 위부불쾌감, 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은변, 설사, 변비, 발진, 발적의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이나타날 수 있습니다.

6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10㎍이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 발생할 수 있습니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

이 제품을 투여할 경우에는 레보도파 약제를 투여하지 마십시오.

6. 임상검사치에의 영향

1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저 장 방 법 : 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

포 장 단 위 : **인코라민정** ····· 5정, 30정, 100정, 120정, 500정

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고, 구입한 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

® = 등록상표

I20 · 060189

종근당
본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)