대한염화나트륨 주 0.45% U.S.P.

0.45% SODIUM CHLORIDE INJ.

전문의약품

■ **원료약품의 분량**

100mL중

염화나트륨(약전) 0.45g

주사용수(약전) ..... 적량

■ **성상**

이 약은 무색투명한 유리, 폴리염화비닐 또는 다층필름플라스틱 재질의 플라스틱 용기에 약간의 짠맛이 있는 무색 투명한 액을 충진한 것이다.

■ **효능 · 효과**

수분 결핍시의 보급, 전해질 결핍시의 보급(나트륨 결핍, 클로르 결핍), 주사제의 용해 희석제.

■ **용법 · 용량**

보통 20~1,000mL을 피하주사, 정맥주사, 점적 정주 또는 직장에 주입한다. 연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다. 주사제의 용해희석에는 적량을 사용한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 경우에는 신중히 투여할 것
   1) 순환기계 기능장애가 있는 환자.
   2) 신장장애가 있는 환자.
   3) 저단백혈증이 있는 환자.
2. 부작용
   1) 대량 급속 투여에 의해 울혈성 심부전, 부종, 산증(아시도시스), 혈청 전해질 이상이 나타날 수 있다.
   2) 항생제, 비타민제, 간장약, 진통진경제와 기타 여러가지 타약제를 혼합 처방 사용할 때는 부작용이 나타나는 수가 있으므로 타약제의 부작용을 충분히 숙지한 다음 신중히 관찰하면서 투여하십시오.
3. 일반적 주의
   이 약을 투여하는 동안 때때로 혈청 전해질치를 측정해야 한다.
4. 얼리지 말아야 하며 충격을 피하십시오.

※ 멸균주사기나 수액셋트를 사용하십시오.

※ 주의 : 의사의 처방 또는 지시에 따라 사용하십시오.

■ **저장방법** 밀봉용기

■ **포장단위** 500, 1000mL

★ 사용기한이 경과되었거나 부유물질, 침전, 변색, 뚜껑의 결함(변질, 변패 또는 오손된 것)이 있을 때는 사용하지 말 것이며 약국, 도매상, 병의원 등의 개설자에 한하여 구입처에서 신품으로 교환하여 드립니다.

작성년월일 2001.4.3

제조원

대한약품공업주식회사

공장 : 경기도 안산시 원시동 736-1