

~2002년 7월 1일 이후부터 재조를 책임법이 시행되고 있습니다.

의사나 약사께서는 부작용을 예방하고 올바른 약을 사용을 위해 약물사용 전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기전 반드시 설명서를 주의깊게 읽어보십시오.

2. 용법·용량을 확인하고 투약하십시오.

3. 용액 후 신속히 사용하고 보존할 필요가 있을 경우 반드시 24시간 이내에 사용합니다. (냉장보관하는 것이 좋습니다.)

4. 사용 후 남은 주사액은 사용하지 않습니다.

5. 습기와 열(직사광선등)을 피해서 사용하고 건조한 곳에 보관합니다.

☎ 소비자 상담전화 080-022-2200

(전문의약품)

(항생물질)

# 세브미드 주 500mg 1g

(세프피라이드 나트륨)

세브미드 주는 제3세대 세팔로스포린계 항생제로 기존 1, 2세대의 작용범위인 그람양성균, 그람 음성균, 인플루엔자균 등은 물론 더 나아가 녹농균, 세라치아, 혐기성균까지 그 항균력이 확대된 광범위 Cephem계 항생제입니다.

또한 세브미드 주는  $\beta$ -lactamase에 안정하므로  $\beta$ -lactamase 산성균에도 항균력을 나타내므로 내성균에 의한 난치성·중증의 세균감염증도 효과적으로 치료합니다.

**【성분·함량】** 이 약 100알중

세프피라이드 나트륨(정가) : 500mg(약가) 10g(약가)

**【성상】**

백색 또는 황색을 띤 분말 또는 덩어리가 든 바이알

**【효능·효과】**

(유요균종)

포도구균, 연쇄구균, 폐렴구균, 백두연쇄구균, 대장균, 시트로박테리움, 클라스트리움, 엔테로박테리움, 프로테우스속, 슈도모나스속, 인플루엔자균, 아시네토박테리움, 박테로이드속

(작용중)

1. 주요효능과

폐렴증, 화상, 수술상 등의 2차감염, 인후두염(인후농양), 금관성 기관지염, 폐도염(폐도주위염, 폐도주위농양), 기관지확장증(각형사), 만성 호흡기질환의 2차감염, 폐렴, 폐화농증, 농흉, 신우신염, 방광염, 전립선염, 부고환염, 담낭염, 담관염, 복막염(골반복막염, 디플라스와 농양 포함), 자궁부속기염, 자궁내감염, 골반사상염, 자궁주위염, 비토린신염, 수막염, 악균증의 용수염

**【용법·용량】**

1. 정맥주사

• 성인 : 세프피라이드 나트륨으로서 1일 1~2g(약가)을 2회 분할 정맥 또는 정적 정맥주사한다.

• 어린이 : 1일 체중 kg당 30~80mg(약가)을 2~3회 분할 정맥 또는 정적정맥주사한다.

난치성 또는 중증감염증 : 증상에 따라 1일 성인용 4g(약가) 어린이는 체중 kg당 150mg(약가)까지 증량하여 2~3회 분할 주사한다.

연령 증상에 따라 증감한다.

2. 근육주사

• 성인 : 세프피라이드 나트륨으로서 1일 1~2g(약가)을 2회 분할 근육주사한다.

연령 증상에 따라 적절히 증감한다.

• 주사액의 조제 : 정맥주사시는 주사용수, 생리식염주사액 또는 5% 포도당주사액에 녹여 천천히 주사한다. 또한 정적정맥주사시는 당액, 전해질액, 아미노산액제 등의 보액에 녹여 30~60분에 걸쳐 주사한다. 복합액 주사용수는 사용하지 않는다. (등장액이 아님)

근육주사시 이 약 0.5g(약가) 100알을 0.5% 리도카인주사액 3ml에 녹여 주사한다.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약에過敏하여 속의 병력이 있는 환자

2) 리도카인등의 아날로이드계 국소마취제에 과민증의 병력이 있는 환자(근육주사시)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 이 약 또는 세밀계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하니 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

2) 해나실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자

3) 골관 또는 부관 형제가 기관지천식 발진 두드러기등의 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질의 환자

4) 심원 간 신장에 환자(혈중농도가 지체하므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용한다.)

5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비강구멍안환자 고령자 전신상태가 나쁜 환자

(비타민 K결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 부작용

1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 헛기 변의 이명 발한 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

- 2) 과민증 : 발진, 두드러기, 홍반, 가려움증, 발열 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 3) 신장 : 드물게 급성 신부전등의 심한 신장에 때때로 BUN 상승, 혈중크레아티닌상승, 단백뇨, 단백뇨등의 신장장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 4) 혈액 : 때때로 과립구감소, 적혈구 감소, 호산구증가, 혈소판감소가 나타날 수 있다. 또한 다른 세균계 항생물질투여시 용혈성 빈혈이 나타날 수 있는 보고가 있다.
  - 5) 간장 : 때때로 GOT, GPT, AL-P, LDH, 빌리루빈,  $\gamma$ -GTP의 상승이 나타날 수 있다.
  - 6) 소변기 : 드물게 발열, 복통, 백혈구증가, 정액, 혈액배출을 수반하는 심한 설사를 주증상으로 하는 증증의 대장염으로 내시경 검사에 의해 위막관 등의 형상을 볼 수 있는 위막관 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 설사, 구역, 구토 등의 증상이 나타나는 경우가 있다.
  - 7) 호흡기 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, PNEUMONIA 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여를 적절한 처치를 한다.
  - 8) 골관절증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.
  - 9) 비대한염증증 : 드물게 비대한 K결핵증상(자반로트록비염증, 출혈경향 등), 비대한 B군 결핵증상(심장, 구내염, 식육부전, 신경병증)이 나타날 수 있다.
  - 10) 기타 : 드물게 두통이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
  - 2) 속 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응시험을 실시하는 것이 바람직하다.
  - 3) 속 발생에 대비하여 구급처치준비를 해두고 투여후에도 한지를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.
  - 4) 음주에 의해 흡수, 구역, 반역, 두통 등의 증상이 나타날 수 있으므로 투여기간 및 투여후 적어도 일주일동안 음주를 피한다.
  - 5) 이 약은 인산염산(나트륨)을 포함하고 있어 신생아에게 할당의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
5. 일부에 대한 투여
- 인산염의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 일부 또는 일소하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
6. 마취에 신생아에 대한 투여
- 마취에 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
7. 임신경사지에 대한 영향
- 1) 태산태반반응을 제외한 베네딕트식, 펠링식과 클리니스트에 의한 요양검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
  - 2) 직장 클스시험 양성인 나타날 수 있으므로 주의한다.
8. 작용상의 주의
- 1) 이 약은 정맥 또는 정맥주사제로만 사용한다. (정맥주사)
  - 2) 정맥내 다량투여에 의해 드물게 혈관통, 혈관성 장애를 일으킬 수 있으므로 주사액의 조제, 주사부위, 주사방법 등에 대하여 충분히 주의하고 주사속도는 가능한 한 천천히 한다. (정맥주사)
  - 3) 근육주사는 부위인 경우에는 필요최소량을 사용한다. (근육주사)
  - 4) 근육주사시 주사부위에 통증, 경련이 나타날 수 있다. (근육주사)
  - 5) 신생아, 마취, 유아, 어린이에는 근육주사하지 않는다. (근육주사)
  - 6) 0.5% 리도카인주사액에 녹인 용액은 절대 정맥주사하지 않는다. (근육주사)
  - 7) 근육주사시 조직, 신경 등으로의 염증을 피하기 위하여 다음 사항에 주의한다.
    - ① 동일 부위에서의 반복주사는 가급적 피한다.
    - ② 신경주사후유를 피하도록 주의한다.
    - ③ 주사부위를 씻을 때 알코올 소독하거나 혈액의 역류가 나타나는 경우에는 즉시 반응을 보고 다른 부위에 주사한다.
    - ④ 원칙적으로 다른 약물과의 혼합주사는 피한다.
  - 8) 용해후 신속히 사용하고 보존할 필요가 있는 경우에는 24시간 이내에 사용한다.
9. 기타
- 이 약은 랩트에 피하주사한 실험에서 장소위축, 정지형성 억제작용이 나타났다는 보고가 있다.

【저장방법】 500mg : 차광밀봉용기, 실온보관  
1g : 차광밀봉용기

【유효기간】 2년

【포장단위】 500mg 1g 10 50 100 바이알

- 의사 또는 약사의 처방에 따라 사용하십시오.
- 유효기간・사용기간이 경과하였거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자를 통하여 분해/환원부(TEL. 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.
- 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.
- 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 분사 영업부/개발부(TEL. 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
- <http://www.kukje-pharm.co.kr>

가장 좋은 약은 사람입니다.



세조발매인  
**국제약품공업주식회사**

경기도 안산시 단원구 호지동 648번지

직선일 : 1989년 1월 9일

개장일 : 2007년 8월 17일