

전문 의약품

강박신경증 및 우울증 치료제

그로민
(클로미프라민염산염)

캡슐 10 mg
25 mg

(클로미프라민염산염)

Clomipramine Cap.(B.P.)

Gromin Cap.

분류번호 : 117(정신신경용제)

그로민은 Imipramine의 3-chloro 유도체로서 선택적으로 Serotonin uptake를 억제하고, Norepinephrine uptake를 차단하여 가장 치료하기 힘들었던 강박신경증 뿐만 아니라 우울증에도 효과적인 제제입니다.

또한 **그로민**은 중추신경계에 대한 진정작용이 적고, 항우울작용 및 항불안작용, 정상행동 항진작용이 현저하며 투여 후 효과발현이 신속하다는 특징이 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
클로미프라마인염산염(Chlomipramine · HCl)(B.P.)..... 10, 25mg

【성상】 · 10mg - 백색 ~ 미황색 분말이 든 상부황색, 하부백색의 경질캡슐제
· 25mg - 백색 ~ 미황색 분말이 든 상부녹색, 하부 백색의 경질캡슐제

【효능·효과】 진정이 요구되는 우울증, 강박상태, 공포상태, 수면발작과 관련된 급발작

【용법 · 용량】

1. 성인 : 초회량으로 클로미프드린염산염으로서 1일 10mg를 경구투여합니다. 점차적으로 1일 30~150mg까지 증량하며 분할투여하거나 또는 취침시 1회 투여합니다. 유지량은 1일 30~50mg입니다.

2. 고령자 : 초회량으로 이 약으로서 1일 10mg을 투여하며 주의하면서 1일 30~50mg까지 증량할 수 있습니다. 성인 유지 용량의 1/2만으로도 만족할 만한 임상반응을 볼 수 있습니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. **기초**
 자살성향 및 항우울제
 주요우울증이나 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에 대한 단기적인 연구에서 항우울제가 위약에 비해 자살 충동과 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 보고가 있습니다. 소아, 청소년 또는 젊은 성인에게 약이 약이나 다른 항우울제 투여를 고려중인 의사는 임상적인 필요성에 위험성보다 높은 지 항상 신중하게 고려해야만 합니다. 단기적인 연구에서 25세 이상의 성인에서는 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살 성향의 위험도를 증가시키는 것 같았고, 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였습니
 다.
 우울증 및 다른 정신과적 질환 자체가 자살 위험 증가와 관련이 있습니다. 항우울제로 치료를 시작한 모든 연령의 환자는 적절히 모니터링 되어야 하며 질환의 악화, 자살 성향 또는 자해성, 공격성, 분노 등 다른 비정상적인 행동의 변화가 있는지 주의 깊게 관찰되어야 합니다. 환자의 가족이나 보호자 또한 환자를 주의 깊게 관찰하고 필요한 경우 의사와 연락하도록 지시됩니다. 이 약은 소아 및 청소년에서의 사용은 승인되지 않았습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 2) 이 약에 과민증 환자
 - 3) 삼한체 항우울약(디벤자제핀계열)에 교차과민증이 있는 환자
 - 3) 이 약의 투여전후 14일 이내에 MAO저해제(모클로베미드와 같은 선택제, 가역적인 MAO-A저해제도 포함), 선택제(적립세로토닌 재흡수 저해제(SSRI), 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 저해제(SNRI), 선택적인 세로토닌 효현제(트립탄류))를 투여하고 있는 환자
 - 4) 최근의 심근경색 환자
 - 5) 뇌내강 환자(항콜린작용에 의해 증상이 악화될 수 있습니다.)
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 1) 지혈할 때는 순환기 불안정 환자(혈압이 저하될 수 있으므로 투여전에 반드시 혈압을 확인합니다.)
 - 2) 심혈관장애, 특히 심혈관부전, 부정맥 환자(발작성 빈맥, 자극전도장애 등)(심기능 및 EEG를 계속 모니터링합니다.)
 - 3) 심부전, 심근경색, 협심증 등의 심질환 환자(순환기계로 영향을 미칠 수 있습니다.)
 - 4) 감작성기능항진증 또는 감작성체제를 투여중인 환자(심독성이 일어날 수 있습니다.)
 - 5) 부신수질종양(크롬친화성세포종, 신장아세포종) 환자(고혈압위기를 유발할 수 있습니다.)
 - 6) 안과질환자, 협우각형 뇌내강 환자(이 약은 항콜린작용이 있습니다.)
 - 7) 배뇨곤란 또는 그 병력이 있는 환자(항콜린작용에 의해 증상이 악화될 수 있습니다.)
 - 8) 중증의 간·신장에 환자(대사배설장애에 의해 이상반응이 나타나기 쉬우며 간질환 환자는 정기적으로 간효소치 검사를 실시합니다.)
 - 9) 전기경련요법을 받는 환자
 - 10) 고령자 또는 정신병의 소인이 있는 환자[특히 야간에 약물원성(정신착란성) 정신병을 유발할 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.]
 - 11) 신장·변비 환자(특히 고령자, 거동이 불편한 환자에서 마비성 강해색을 유발할 수 있습니다.)
 - 12) 간질 등의 경련성 질환 또는 그 병력이 있는 환자(경련을 일으킬 수 있습니다.)
 - 13) 조울증 환자(조전, 자살사고 등이 나타날 수 있습니다.)
 - 14) 뇌의 기질적 장애 또는 정신분열증의 소인이 있는 환자(정신증상이 악화될 수 있습니다.)

4. 이상반응
이상반응은 보통 완화하고 일시적이며, 부역을 계속하거나 용량을 감소시키면 사라집니다. 이상반응이 항상 혈장 내 약물농도나 투여용량과 관계가 있는 것은 아니며 때때로 우울증 증상(피로, 수면장애, 격원, 불안, 변비, 구갈 등)과 특정 이상반응의 구별이 어려울 때도 있습니다.

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우에는 부위를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 신경이완장애성중추근(Neuroleptic Malignant Syndrome) : 운동마비, 심한근육강직, 연하곤란, 빈맥, 혈압변화, 발한 등이 나타나고 이러한 증상과 함께 발열이 나타나는 경우에는 부위를 중지하고 체온강하와 수분보충 등의 전신적 치료와 함께 적절한 처치를 합니다. 이러한 증상의 발현시에는 백혈구 증가, 혈청 CPK 상승이 자주 나타나고 의식장애나뇌증상을 수반한 신경근지체가 나타날 수 있습니다. 또한 다른 삼환계 항우울제에서 고열이 지속되고 미오도닌배설, 효소판독, 소변하혈과 탈수증상, 급성 신부전으로 발전해서 사망했다는 보고가 있습니다.
- 3) 정신신경적 : 소아, 청소년 및 젊은 성인(18~24세)에서의 자살생각의 증가, 졸음, 과다, 때때로는 성, 식욕증가, 지터움, 진전 등의 파킨슨증상, 두통, 간지성 경련, 때때로 혼돈, 부위감각이상, 환각(특히 고령자 및 정신신경 환자), 불안, 각혈, 수면장애, 조증, 경조증, 공격성, 기어력장애, 이인증, 우울증상화, 집중력장애, 불면, 야동, 하품, 현소리, 정신착란, 언어장애, 마비, 근야화, 근긴장형성, 드물게 정신병적 증후의 활성화, 경련, 운동실조, 간질발작, 매우 드물게 EEG변화, 이상일고, 권대강, 발한 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 항콜린작용 : 구갈, 발한, 빈맥, 시소정장애, 시각장애, 배뇨장애, 때때로 홍조, 동공산대, 안내압상승, 홍채조절장애, 매우 드물게 녹내장 등이 나타날 수 있습니다.
- 5) 광민증 : 때때로 발진, 드물게 광과민증, 매우 드물게 알려지성 폐포염(폐렴)(호산구증가를 수반하는 경우를 포함), 저혈압을 포함한 전신적인 아나필락시스/아나필락시스양 반응이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 부위를 중지합니다.
- 6) 순환기계 : 때때로 동성 빈맥, 심계항진, 체위성 저혈압, 저혈압, 심박동, 정상적인 심기능을 가진 환자에서 임상적으로 무관한 ECG변화(ST, T 변화), 드물게 부정맥, 혈압상승, 매우 드물게 심전도장애(QRS복합체의 확장, 각률복, PQ변화) 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 경색 : 자반, 백혈구감소, 혈소판감소, 간지성구증, 무구립구증 등의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 혈액예사를 실시하고 이상(전조증상으로서 발열, 인두통, 인플루엔자양증상)이 나타날 수 있습니다. 이 인정되는 경우에는 부위를 중지합니다.
- 8) 간장 : 드물게 황달, 간염, 트랜스아미나제(ALT, AST 등) 상승 등의 간장애가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 부위를 중지합니다.
- 9) 소화기계 : 드물게 장관마비(식욕부진, 구역, 구토, 현저한 빈맥, 복부팽만 또는 이완, 경내용물 울체 등)을 일으키고, 미식성 장애에서도 이행될 수 있으므로 장관마비가 나타나는 경우에는 부위를 중지합니다. 또한 구역, 구토, 식욕부진, 배설, 미각이상 등이 나타날 수 있습니다(이 약의 진토작용에 의하여 구역, 구토가 온배될 수 있으므로 주의합니다).
- 10) 내분비계 : 드물게 저나트륨혈증, 저칼륨혈증, 요중 나트륨 배설량 증가, 고강도, 경련, 의식장애 등을 수반한 항이노호르몬분비이상증후군(Syndrome of Inappropriate ADH)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 부위를 중지하고 수분섭취를 제한하는 등 적절한 처치를 합니다. 또한 프로락틴의 분비촉진, 때때로 체중증가, 성욕, 성기능저하, 유무정, 유방확대 등이 나타날 수 있습니다.
- 11) 장기폐해 : 때때로 위장구의 불수의운동이 나타날 수 있고 투여중지 후에도 이러한 증상이 지속될 수 있습니다.
- 12) 감각기계 : 드물게 미각이상, 이형 등이 나타날 수 있습니다.
- 13) 골격계 : 골절(주로 50세 이상의 환자를 대상으로 한 외국 역학연구에서 선택적 세로토닌 재흡수 저해제(SSRI) 및삼환계 항우울제(TCA)를 투여받은 환자에서서 골절 위험이 증가하였음이 보고되었고, 작용기전은 밝혀지지 않았으나).
- 14) 기타 : 용량을 감소시키거나 갑자기 부위를 중지한 경우에 때때로 구역, 구토, 복통, 설사, 불면증, 두통, 신경과민증, 불안 등이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 매우 드물지만 백혈구수가 상승이 보고되어 있으므로 특히 치료 처음 몇 달간이나 장기투여 중에는 혈구수를 정기적으로 검사하고 발열, 인후통 등의 증상발현 여부를 계속 관찰한다.
- 2) 삼한상, 항우울약은 경련여부를 낮추는 것으로 알려져 있으므로 간질환자에게 투여할 때에나 다양한 병인에 의한 삼한상, 항정신병약, 간질, 알코올이나 항경련성 약물의 투여중지 등 특정 유발요인이 있는 환자에서 투여할 경우에는 특히 주의할 필요가 있다. 간질 발현은 용량의존성이 있으므로 약의 1일 추천용량을 초과하지 않는다.
- 3) 공황장애가 있는 환자들에는 이 약의 투여중지가 더 현저한 불안증상을 경험할 수 있다. 이러한 초기의 역설적 반응인 불안증상의 증가는 치료 첫 수일 이내에 가장 현저하게 나타나서 보통 2 주 이내에 경감된다.
- 4) 삼한상 항우울약은 장기투여라는 환자에서 충치가 증가되었다는 보고가 있으므로 장기투여중에는 정기적으로 치과검진을 받는다.
- 5) 주요 우울증을 가진 환자(성인, 소아)는 항우울제를 복용중이었다라도, 절환의 뚜렷한 효전이 있을때까지 우울증상의 악화, 자살 충동과 행동(자살 성향), 비정상적인 행동, 기분 변화의 발현을 경험할 수 있다.
- 6) 자살은 우울증 및 어떤 다른 정신과적 질환의 알려진 위험요소이며, 이러한 질환들은 그 자체가 자살의 가장 강력한 예측인자이다. 그러나, 항우울제가 치료 초기 단계 동안 어떠한 환자들에 있어서든 우울증상의 악화 및 자살성향의 발현을 유도할 수 있다. 이러한 우려가 장기간 지속되어 왔습니다. 항우울제(SSRI 및 기타)의 위약 대조, 단기간 임상시험의 통합 분석은 이러한 약물들이 주요 우울증 및 다른 정신과적 질환을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성인(18-24세)에서 자살 생각 및 행동(자살 성향)의 위험도를 증가시킨다는 것을 나타내었습니다. 단기간의 연구에서는 25세 이상의 성인에서 위약과 비교하였을 때 항우울제가 자살 성향 위험 증가를 나타내지 않았습다.
- 65세 이상의 성인에서는 위약에 비해 항우울제에서 이러한 위험이 감소하였습다.
- 7) 주요 우울증, 강박장애 또는 다른 정신과적 질환을 가진 소아 및 청소년은 대소변의 빈 위약 대조 임상시험의 통합 분석은 4.400명 이상 환자에서서의 9개 위약 대조군에 관한 총 24건의 단기간 임상시험을 포함하였습니다. 주요 우울증 및 다른 정신과적 질환을 가진 성인을 대상으로 한 위약 대조 임상시험 통합분석은 77,000명 이상 환자에서서의 11개 항우울제에 관한 총 295건의 단기간(중증값: 2개월의 지속 기간) 임상시험을 포함하였습니다. 약물 간에 자살성향의 위험도에 있어서는 상당한 차이가 있었으나, 연구된 대부분의 모든 약물에서 젊은 성인에서의 자살성향 증가 경향은 확인되었습니다. 다른 적응증들이 자살성향의 절대적 위험도에 있어서 차이가 있었으

주요우울증에서 가장 발생수가 높았습니다. 그러나, 위험도의 차이(항우울제 vs 위약)는 연령층 내에서, 그리고 적응증 간에 상대적으로 안정하였습니다. 이러한 위험도의 차이(치료받은 환자 1,000명 당 자살성향 발생수에 있어서 항우울제-위약간의 차이)를 아래 표 1에 나타내었습니다.

351

연령대	치료받은 환자 1000명 당 자살성향 발생수에 있어서 항우울제-위약간의 차이
	항우울제 관련 증가
<18	14에 많음
18-24	5에 많음
	항우울제 관련 감소
25-64	1에 적음
≥65	6에 적음

- 8) 더 많은 소아 임상시험에서라도 자살은 발생하지 않았습니니다. 성인에서의 임상시험에서는 자살이 발생하였으나, 이 소아 자살에 대한 약물의 영향에 대해 어떤 결론을 내릴 만큼 충분한 증거가 없습니다. 자살성향의 위험이 약물의 가장 긴간(즉, 여러달 이상) 사용에까지 확장될 수 있는 지에 대해서는 알려져 있지 않습니다. 그러나, 우울증을 가진 성인을 대상으로 한 위와 대조의 지속적인 임상시험으로부터 항우울제의 사용이 우울증의 재발을 지연시킬 수 있다는 충분한 근거가 있습니다.
- 9) 성인이나, 수개월 이상의 장기 부려 환자에서도 자살성향의 증가가 있는지 및 수 없습니다. 항우울제를 사용 중인 환자는 부려 주지 수개월간 또는 용량 변경(증량 또는 감량)을 할 때 자살 성향, 자해, 자결 시도의 발현을 주의 깊게 모니터링하여야 합니다. 치료초기에는 벤조디아제핀계 약물이나 항정신병약을 병용부여하는 것이 필요할 수도 있습니다.
- 10) 항우울제 사용 환자에서 불안, 초조, 공황장애, 불면, 흥분, 적대감, 공격성, 충동성, 정좌불능증, 건조증, 중증이 나타날 수 있는데, 이러한 증상과 관련성은 확립하지 않으나 자살성향 발현의 전구증상일 수 있으므로 주의합니다. 그리고 가족 및 보호자에게 이러한 증상이나 자살성향에 대해 매일 모니터링하여 증상 발현시 즉시 의사에게 알리도록 지도합니다.
- 11) 우울증상의 지속적인 악화, 자살성향의 발현 또는 자살성향의 전구증상일 가능성이 있는 증상(중증이나 갑작스러운 증상, 원래의 환자에게 나타난 것이 아닌 증상)이 나타날 시 약의 부려 중단을 고려하여야 합니다.
- 12) 대조 임상시험에서 증명되지는 않았으나 양극성 장애를 가진 환자에서 우울증 완화기간에 항우울제를 사용 시 조증 또는 조증용 삽화를 촉진할 가능성이 있습니다. 따라서 항우울제 투여 전 자살, 양극성 장애 또는 우울증의 가족력을 포함한 자세한 환자력적 병력에 대해 확인하여 양극성 장애의 가능성이 있는지 신중하여야 합니다. 실제로 주기적 기분장애 환자들에게 사용시 항우울제와 부려서 우울증상에서 경조증 또는 조증발작을 일으킨다는 보고가 있습니다. 이러한 경우에는 이 약의 용량을 감소시키거나 부려를 중지하고 항정신병약을 부려할 필요가 있을 수 있습니다. 위의 증상이 경감되면 필요한 경우 소량씩 이 약을 다시 투여할 수도 있습니다.
- 13) 갑작스러운 부려중단으로 어지러움, 수면장애, 불안 등과 같은 급단증상을 경험할 위험이 있으므로 처방의사와 상담 없이 환자나 보호자가 임의로 약의 부려를 중단해서는 안됩니다. 부려를 중단할 경우에는 수주나 수개월에 걸쳐 점진적으로 용량을 감할할 것이 권장됩니다.
- 14) 약물치료 개시 후 처음 2-4주 동안 개선의 효과가 없으면 다시 주의깊게 모니터링하면서 부려하고, 신경정신과적 의사반응이 나타나면 이 약의 부려를 중지합니다.
- 15) 삼한계 항우울제를 부려중인 정신분열증 환자에서 때때로 정신병이 활성화되었다는 보고가 있습니다.
- 16) 삼한계 항우울약의 할플린산염에 의한 눈물분비감소 및 유점(mucor)분비의 축적으로 인해 콘택트렌즈를 착용하는 환자의 각막상피가 손상될 수 있습니다.
- 17) 수술시 마취의사에게 이 약의 부려사항을 알립니다.
- 18) 졸음, 시각장애, 기타 중추신경계 증상이 나타날 수 있으므로 이 약을 부려중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다. 또한 알코올이나 다른 약물에 의해 이러한 효과가 증강될 수 있음을 환자에게 주지시킵니다.

6. 상호작용

- 1) MAO저해제: MAO저해제 부여를 중지하기 최소한 2주 전에는 이 약을 부여하지 않습니다.(고혈압위기, 이상교열증, 근간대경련, 경직성 발작, 정신착란, 혼수 등의 심한 증상이 일어날 수 있습니다.) 이러한 사람은 이 약 부여 전에 MAO저해제를 부여하는 환자에도 적용되며 이 약 또는 MAO저해제를 소량씩 부여하기 시작하여 점차적으로 증량하고, 그 효과를 모니터링 합니다. 이 약을 모클로페미드와 같은 가역성 MAO-A저해제를 부여한 후 24시간 후에 부여할 수 있다는 증거가 없이 이 약을 사용한 후 MAO-A저해제를 부여할 때에는 2주간의 휴약기간 동안 관찰한 후 부여하여야 합니다.
- 2) 이드레날린 신장저작단위: 이 약은 구아네티딘, 베타나딘, 레세프린, 클로니딘, α-메틸도파 등의 항고혈압 효과를 저하 또는 방해시킬 수 있습니다. 혈압강화의 병용부여가 필요한 환자는 다른 계열의 약물(이노제, 혈관확장제, β-차단제 등)을 부여합니다.
- 3) 고강신경통분약: 이 약은 에페네프린, 노르에페네프린, 이소프로테레놀, 에페드린, 페닐레프린(카소마취제 등) 등의 심혈관 효과를 증강시킬 수 있습니다.
- 4) 중추신경통분약: 삼한계 항우울약은 알코올이나 다른 중추신경억제제(바르비탈계 약물, 벤조디아제핀계 약물, 전신마취제 등)의 효과를 증강시킬 수 있습니다.
- 5) 항콜린약: 삼한계 항우울약은 항콜린성 약물(페노치아진계 약물, 항파킨슨제, 항히스타민제, 아트로핀, 비베리딘 등)의 눈, 중추신경계, 위장관, 방광에 대한 효과를 증강시킬 수 있습니다.
- 6) 퀴니딘: 삼한계 항우울약은 퀴니딘제일의 부동맥용량과 병용부여하지 않습니다.
- 7) 선택적인 세로토닌 재흡수 저해제(SSRI), 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 저해제(SNRI), 선택적인 세로토닌 α₁ 수용체拮항제(트립탄류)와 병용부여시 세로토닌에 상가작용을 일으켜 생명을 위협하는 세로토닌 증후군을 일으킬 수 있습니다. 플루복사민, 플루복사민은 이 약의 혈장농도를 상승시켜 이상반응을 유발할 수 있습니다.
- 8) 간소하유도제: 간의 약물대사효소를 활성화시키는 약물은 이 약의 대사를 촉진시켜므로 혈장농도를 저하시켜 효과를 감소시킬 수 있습니다. 또한 페니토인과 카르바마제핀이 혈장농도를 증가시켜 이에 따른 이상반응을 유발할 수 있으므로 이들 약물의 용량을 조절합니다.
- 9) 항진성빈약: 항진성빈약과 병용하면 삼한계 항우울약의 혈장농도를 증가시켜 경련역치를 낮추고 간질을 유발할 수 있습니다. 치료효과와 부작용을 면밀히 관찰합니다.
- 10) 항응고제: 삼한계 항우울약은 간대사를 억제하여 쿠마린의 항응고효과를 증강시킬 수 있으므로 이 약 투여 중에는 혈장 프로트롬빈시간을 주의있게 관찰합니다.
- 11) 시메티딘, 메틸셀레니드, 에스트로겐 등은 삼한계 항우울약의 혈장농도를 상승시켜므로 이 약의 용량을 감소시켜서 서여합니다.
7. 임부 및 수유부에 대한 부여
 - 1) 드물게 삼한계 항우울약이 태아에 영향(발육이상 등)을 주었다는 보고가 있고 또한 임신중의 부여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 부여합니다.
 - 2) 출산까지 삼한계 항우울약을 부여한 산모의 태아에서 출산 후 수시간 내지 수일동안 호흡곤란, 수면, 산통, 자극, 과열, 저 고혈압, 진전·경직 등의 급만증상이 보고되어 있으므로 과소한 출산전정임로부터 7주전에는 이 약의 부여를 철저히 중지합니다.
 - 3) 이 약의 활성성분은 모유로 분비되므로 수유부는 이 약의 부여를 완전히 중지하여야 합니다.
8. 소아 및 청소년에 대한 부여

소아 및 청소년에 대한 안전성 및 유효성이 확립되지 않았으므로 이 약을 부여하지 않는 것이 바람직합니다.(경고항 참조)
9. 고령자에 대한 부여

고령자는 특히 항콜린성 이상반응이나 신경정신과적 또는 심혈관계 이상반응에 민감하고 약물의 대사, 배설능력이 감소되어 있어 치료용량의 부여로도 혈장농도가 상승되는 위험을 초래할 수 있으므로 초기 및 EEG를 계속적으로 모니터링하면서 신중히 부여합니다.
10. 과량부여시의 처치

이 약의 과량투여시의 증상·증후는 다른 삼환계 항우울약에서 보고된 것과 유사합니다. 심장이상과 신경학적 장애가 주된 복합증상이며 소량이라도 소이가 우발적으로 복용한 경우 심각하며 치명적인 것으로 간주합니다. 이 약은 다른 항불안약에 비해 과량투여에 의한 사망에 적은 것으로 보고되어 있습니다.

- 1) 증상 : 이 약의 과량투여에 의한 증상은 4시간 이내에 나타나며 2시간 후에 가장 심각한 상태에 이릅니다. 약물의 흡수지연(항콜린효과), 긴 반감기, 경관송출로 인하여 환자는 46일정도 위험할 수 있습니다.
 - ① 추추진단계 : 졸음, 지각발열, 손, 혼돈실조, 들뜨는 상태, 격열, 반사항진, 근육강직, 무도병, 야메도제형 운동, 경련
 - ② 심혈관계 : 저혈압, 빈맥, 부정맥, 전도장애, 속, 심부전, 매우 드물게 심정지
 - ③ 기타 : 호흡억제, 청색증, 구토, 발열, 산통, 발한, 빈뇨, 무뇨증
- 2) 처치 : 특별한 해독제는 없으며, 치료는 대증적, 보조적으로 실시합니다. 이 약의 과량투여가 추정되는 환자는 누구든지(특히 소아의 경우) 입원시키고 최소한 72시간동안 세심한 감시가 필요합니다. 환자가 의식이 없으면 위 세척 전에 기관내에 관을 삽입하여 기도를 보호하고, 구도는 유도하지 않도록 합니다. 이러한 처치는 이 약의 항콜린효과가 위배출을 지연시킬 수 있으므로 과량투여 후 12시간 그 이상까지도 행할 필요가 있습니다. 활성탄을 투여하면 약물흡수를 감소시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 증상에 대한 치료는 집중치료의 현대적 방법에 근거하여 실시합니다. 혈액 내 약물, 전해질농도를 계속 확인하고, 필요하면 항응고제, 인공호흡, 인공소생술 등의 응급치료를 실시합니다. 피소스 트리검은 심한 빈맥, 부전수축, 간질을 일으킬 수 있다고 보고되어 있으므로 이 약의 과량투여시에는 추천되지 않습니다. 이 약은 혈장농도가 낮기 때문에 혈액투석이나 복막투석은 효과가 없습니다.
11. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【포장단위】 100, 500캡슐

【최신정보 확인 방법】 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】 소비자 상담전화 : 080-587-7575 (수신자 요금부담)

* 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여
국외로 수출할 수 있다.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

<http://www.myunginph.co.kr>

GRC 0810-14

