

조 제 용
일반 의 약 품
분류번호:222

엑스펙토 시럽5% (L-카르보시스테인) 1000mL



【원료약품의 분량】 100mL 중

L-카르보시스테인 (KP).....	5g
첨가제 (보존제): 파라옥시벤조산메틸 (KP).....	56mg
첨가제 (보존제): 파라옥시벤조산프로필 (KP).....	24mg

【성상】 연호박색의 시럽제

【효능·효과】

1. 주효능효과

- 1) 다음질환에서의 객담배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염, 비인두염
- 2) 만성부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

【용법·용량】

1. 성인: L-카르보시스테인으로서 초기에 1회 750mg (15mL) 1일 3회 경구투여하고 증상이 호전되면 1회 500mg (10mL) 1일 3회 투여한다.
2. 소아: 6~12세: 1회 250mg(5mL) 1일 3회 투여한다.
2~5세: 1일 250~500mg(5~10mL)을 4회 분할 투여한다.
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
※연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것: 위·십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것: 1) 간장에 환자 2) 심장에 환자 3) 위·십이지장궤양의 병력이 있는 환자
3. 부작용: 1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 복부팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈 등이 나타날 수 있으며 민감한 환자에서 구내염이 나타날

수 있다. 2) 과민증: 때때로 발진, 홍반, 습진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 3) 신경계: 드물게 두통이 나타날 수 있다. 4) 호흡기계: 민감한 환자에서 비염이 나타날 수 있다. 5) 기타: 때때로 가려움, 심계항진, 콧물, 전신의 압박감이 나타날 수 있다.

4. 임부에 대한 투여: 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 수유부에 대한 투여: 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
6. 소아에 대한 투여: 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
7. 고령자에 대한 투여: 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
8. 과량투여시의 처치: 과량투여시 위세척이 유익하며, 위장장액이 가장 흔한 증상이다.
9. 적응상의 주의: 항생물질과 염산트리메토클을 함유하는 시럽제와의 혼합에서는 외관(색, 탁함), 냄새 등의 변화가 일어날 수 있으므로 이들 약과의 병용을 필요로 할 경우에는 따로따로 투여한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 60, 500, 1000mL리터

- ♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다
- ♣ 이 라벨의 개정일자 2015년 12월 17일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지 (www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실 (080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다
- ♣ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

EX5 2015.12.17-16

65X20mm

우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장: 경기도 화성시 향남읍
제약공단 2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211