

진해제

코데밀정



<한외마약>

의약품 분류번호	222 진해거담제
-------------	--------------

코데밀정은 코데인계제로 습관성이나 탐닉성을 초래하지 않는 강력한 진해제입니다.

【성분·함량】 1정 중

디히드로코데인타르타르산염(USP).....	5mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	1.5mg
dl-메틸에페드린염산염(KP).....	17.5mg
카페인무수물(KP).....	10mg
첨가제(타르색소):황색4호, 황색5호(KPTaCS)	
첨가제(동물유래):유당수화물(소-우유)	

【성상】 황색의 원형 정제

【효능·효과】 기침, 가래

【용법·용량】 성인 1회 2정, 1일 3회 식후 복용합니다.

소아용량 : 11세이상~15세미만 : 1~2정 / 8세이상~11세미만 : 1정

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 황색 4호(타르타르진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 기려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람.
- 3) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 신장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자(염산페닐프로파놀아민, 염산메톡시페나민, 염산메틸에페드린, 염산에페드린, 염산수도에페드린을 함유하는 제제)
- 5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약물과 동시에 복용하지 말 것.
- 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시킬 것.
- 5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는게 좋다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것.

6. 보관 및 취급상의 주의.

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 차광한 기밀용기, 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 1,000정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831

최종개정년월일:2012. 12. 17
작성년월일:2012. 12. 26



대우제약(주)

부산광역시 사하구 다대로 153 (신평동)
http://www.daewoopharm.com

※ 이 첨부문서 작성일자(2012년 12월 26일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com 나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.