

뇌대사기능 촉진제

뉴로메드[®] 800mg 정

옥시라세탐

전문의약품
분류번호119

뉴로메드정은 ISF(SmithKline Beecham)사에 의해 연구 개발된 신약인 Oxiracetam제제로서 대뇌피질의 종합기능을 활성화시키는 뇌대사기능 촉진제입니다.

뉴로메드정은 뇌신경세포막을 안정화시키고, 뇌내 ATP 유효율을 증가시키며, 콜린성 신경전달을 촉진하여 뇌대사기능을 개선을 통해 뇌혈관질환, 뇌손상 등 뇌기능 부전으로 인한 기질성 뇌증후군(OBS)에 효과적으로 작용하여 뇌의 인식기능, 기억력, 주의·집중력, 언어·행동력 등을 향상시키는 것으로 알려져 있습니다.¹⁻⁶

■ 약리작용 및 특장점

1. 뉴로메드정은 대뇌피질과 해마의 콜린성 신경섬유를 활성화하여 Acetylcholine 이용율을 증가시킴으로써 약화된 인식기능을 회복시켜줍니다.
2. 뉴로메드정은 노화나 뇌혈관손상으로 감소된 뇌인지질 생합성을 촉진시켜 신경세포막의 안정화 작용이 뛰어납니다.
3. 뉴로메드정은 뇌허혈시 뇌내 ATP 및 Glucose 함량을 증가시켜 저하된 뇌에너지 대사를 촉진하며, 뇌에너지 균형(ATP/ADP)을 정상화시킵니다.

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1정 중

- 유효성분 : 옥시라세탐(KP) 800mg
- 기타 첨가제 : 크로스카르멜로오스나트륨, 포비돈K30, 스테아르산마그네슘

■ 성상 : 흰색의 장방형 정제

■ 효능·효과

다음 질환으로 인한 증상(기억력·주의력·집중력 감소, 지남력장애, 언어·행동장애, 정서불안, 의욕결핍)의 개선 : 알츠하이머형 치매, 다발경색성 치매, 뇌기능부전으로 인한 기질성 뇌증후군

※ 국내임상시험결과 추가 제출.

■ 용법·용량

성인 : 옥시라세탐으로서 1회 800mg 1일 2회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증(심한 증상)의 신부전 환자
 - 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신부전 환자(감량투여)하는 등 신중히 투여한다.)
3. 부작용
 - 1) 중추신경계 : 흥분, 수면장애, 무력감, 두통, 두중, 불안, 초조 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량(줄임) 하여 투여한다.
 - 2) 소화기계 : 구토, 구갈, 위통 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 기타 : 혈압상승, 시야흐림, 청각장애 등이 나타날 수 있다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(사용기간 : 제조일로부터 48개월)

■ 포장단위 : 30정/병, 100정/병, 500정/병

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2016년 12월 19일

■ 참고문헌

1. Activity of Oxiracetam in patients with Organic Brain Syndrome: A Neuropsychological study. Clinical Neuropharmacology 1986 ; 9(3) : 73-87
2. Double-blind, Placebo-Controlled, Clinical, Psychochrometric and Neurophysiological Investigations with Oxiracetam in the Organic Brain Syndrome of Late Life. Neuropsychobiology 13 ; (1985) : 44-52
3. The effects of Oxiracetam (ISF 2522) in patients with organic brain syndrome. Drug Development Research 1982 ; 2 : 447-462
4. Oxiracetam in dementia : a double-blind, placebo-controlled study. Acta Neurol 1992 ; 86 : 237-241
5. Oxiracetam in the treatment of primary degenerative and multi-infarct dementia : a double-blind, placebo-controlled study. Neuropsychobiology 1989 ; 21 : 141-145
6. Clinical and neuropsychological study with oxiracetam versus placebo in patients with mild to moderate dementia, Journal of Neural Transm 1987 ; 24 : 293-298

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

17-7-6

※ 어린이의 손이 닿지않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10