

2B092M10808



간질환 치료 · 간장 보호

신일 실리마린 정 35mg

(카르두스마리아누스 엑스)

일반의약품

분류번호 : 391

간장은 인체의 중요 장기중의 하나로, 장에서 흡수된 영양소를 우리 몸에서 이용할 수 있도록 대사, 저장하는 작용을 하고, 담즙을 생성하여 여러 영양소의 흡수를 도와줍니다. 또한 우리 몸이 적절한 기능을 하는데 절대적으로 필요한 물질들을 만들고, 이물질 및 독성물질을 해독하는 작용을 하는 등 우리 몸을 보호하는 중요한 역할을 합니다.

신일실리마린정 35mg은 간세포의 보호 및 재생작용을 하는 silymarin을 활성성분으로 하는 식물성분의 간장질환 예방 · 치료제로서 과로, 스트레스, 음주, 영양불량, 독성물질 등으로 인한 각종 간질환에 우수한 치료효과를 나타내고 간장의 손상으로 인한 만성 피로, 전신권태감, 식욕부진, 소화불량 등의 증상을 개선시켜줍니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

카르두스마리아누스 엑스(디.에이.비.)	50mg
(실리마린으로서)	35mg
실리빈으로서	15mg
황색 5호, 청색 1호, 적색 40호(타르색소고시)	

【성상】

적갈색의 원형 덩이형

【약리 작용】

1. 간세포 보호작용

간세포막의 수용체에 결합하여 세포막을 안정화하여 유해물질의 간 세포내 침투 및 간세포내 물질의 유출을 방지함으로써 간세포 보호작용을 합니다.

2. 간세포 재생작용

간세포의 RNA-polymerase I 의 작용을 촉진하여 rRNA의 합성을 증가시키므로 단백질 합성 부위인 리보솜의 양을 증가시키고 이에 따라 단백질 합성이 증가되어 손상된 간세포의 재생을 빠르게 합니다.

3. 항산화 작용

세포내 유리 라디칼을 제거하고, 생체내 항산화물질인 glutathione의 농도를 증가시켜 과산화로 인한 세포괴사를 막아줍니다.

4. 항염증 작용

염증 매개물질인 leukotriene의 합성을 억제하여 간세포의 염증을 완화시켜줍니다.

5. 항섬유화 작용

콜라겐의 축적을 억제하여 섬유조직 증식으로 인한 간 손상을 예방합니다.

• Reference

1. Saller R, Meier R, Brignoli R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases. *Drugs*. 2001;61(14):2035-63.
2. Dehmlow C, Murawski N, de Goot H. Scavenging of reactive oxygen species and inhibition of arachidonic acid metabolism by silybin in human cells. *Life Sci*. 1996;58(18):1591-600.

3. Dehmlow C, Erhard J, de Goot H. Inhibition of Kupfer cell functions as an explanation for the hepatoprotective properties of silybinin. *Hepatology*. 1996 Apr;23(4):749-54.

【효능 · 효과】

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 간세포 보호, 만성 간염, 간경변

【용법 · 용량】

성인 : 실리마린으로서 1회 35~140mg(1~4정)(또는 실리빈으로서 1회 15~60mg), 1일 3회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아

2. 다음과 같은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

임부, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 5년

【포장단위】 100T, 300T, 1000T

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상 규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)



분리배출

설명서 개정년월일 : 2008. 3. 24