

소화불량, 가스제거 디제스탈 정

분류번호:233
일반의약품

Dizestal Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

판크레아틴(별규).....175mg
(아밀라제.....4200F.I.P 단위)
(리파제.....5367F.I.P 단위)
(프로테아제.....222F.I.P 단위)
•기원동물 : 돼지 •사용부위 : 췌장
디메치콘(N.F).....25mg
우담즙엑스(KPC).....25mg
(콜린산으로서.....11.3mg)
•기원동물 : 소 •사용부위 : 담즙
헤미셀룰라제(별규).....50mg
(125 헤미셀룰라제 단위)
•첨가제(동물유래):유당<기원동물:소, 사용부위:우유>
•첨가제(동물유래):젤라틴<기원동물:소, 사용부위:가죽>
•첨가제(타르색소):정색 1호, 황색 4호

【내용량】

• 디제스탈 20정 : 722mg×20정(총 중량 14.44g)
• 디제스탈 100정 : 722mg×100정(총 중량 72.2g)
• 디제스탈 400정 : 722mg×400정(총 중량 288.8g)
• 디제스탈 500정 : 722mg×500정(총 중량 361g)

【성상】 장방형의 장용피를 한 녹색 당의정

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(입맛없음), 과식, 체함(위체), 소화촉진,
소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선 검사전의 가스제거
<다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.>

【용법·용량】

성인 1회 1-2정을 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
(1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
(2) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로
이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는
신중히 투여한다.
- 일반적 주의
(1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
(2) 2주 정도 투여하여도 증상 개선이 없을 경우에는
투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
(1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
(2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한
곳에 밀전하여 보관한다.
(3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바
꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20, 100, 400, 500정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

* 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에
따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약
구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여
교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2008년
06월 09일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약
개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2008년 06월 09일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공정:강원도 황성군 황성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수약품제조관리기준

KGMP적격업소제품