

간염 · 간장보호

비디카 정

(비페닐디메틸디카르복실레이트)

분류번호:391
전문의약품

Bidica Tab.

간장(Liver)은 각종물질의 합성, 대사, 해독, 담즙분비 등 생명유지에 필수적인 중요한 생체기능을 담당하는 장기이므로 간기능에 이상이 생기면 신체에 심각한 이상을 초래할 수 있습니다. 대부분의 간질환은 발병초기에는 무증상으로 서서히 발병하다가 일단 증상(피로감, 식욕부진, 오심, 무력감 등)이 나타나면 이미 심각하게 진행된 상태여서 치료에 어려움이 있습니다. 간질환이 발생하여 간세포가 파괴되면 간세포내에 존재하던 효소(GOT,GPT)가 혈액으로 유출되는데 이 효소 수치를 측정함으로써 간질환을 진단할 수 있습니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

비페닐디메틸디카르복실레이트(별규).....25mg
· 유당 <기원 : 소, 사용 : 우유>

【성 상】 흰색의 장방형 정제

【효능 · 효과】

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트랜스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

【용법 · 용량】

성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25-50mg, 1일 3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 만성 활동성 간염 환자
 - 간경변 환자
- 이상반응
 - 입안미름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
 - 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
 - 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

3. 상호작용

이노신(Inosine)과 함께 투여시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.

5. 소아에 대한 투여

소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

7. 임상검사치에의 영향

치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 차광기밀용기

【포장단위】 60, 90, 120, 1000정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유통)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2008년 12월 15일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2008년 12월 15일