



중추성 근이완제

페리손® 주정

톨페리손염산염

전문외약품

122 : 골격근 이완제

페리손은 Propanediol 또는 Benzodiazepine계와는 다른 β -aminoketone구조의 톨페리손염산염을 주성분으로 하는 국소혈류개선의 약리작용을 겸비한 중추성 근이완제로, 여러원인에 의한 경직성마비 증상에 따른 말초 혈관 장애에 의한 제증상 및 근긴장성, 경련성 제질환등에 효과적으로 사용할 수 있는 근경축 치료제입니다.

【성분 · 함량】

· 페리손정 : 1정중 톨페리손염산염(KP).....	100mg
· 페리손주 : 1앰플(1mL)중	
주성분 : 톨페리손염산염(KP).....	100mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	0.6mg

【성상】

- 페리손정 : 백색의 원형 당의정
- 페리손주 : 무색투명한 액이 든 갈색 앰플 주사제

【효능 · 효과】

1. 근골격계의 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 요통, 관절질환, 외상 등
2. 신경계 질환에 의한 근육연축

【용법 · 용량】

- 페리손정
성인 : 톨페리손염산염으로서 1회 100mg~150mg을 1일 3회 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.
- 페리손주
성인 : 톨페리손염산염으로서 1회 100mg(1앰플)을 1일 2회 근육주사 또는 천천히 정맥주사하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
앰플주사제는 용기절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할수 있으므로 사용시 유리파편혼입이 최소화될수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의하십시오.(앰플주사제에 한함)
2. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 3개월 미만의 영아(정제에 한함)
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는환자(정제에 한함)
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약물 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다.)

4. 부작용

- 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 호흡기계 : 드물게 흉내압박감, 호흡장애가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 간장 : 드물게 간장에(약물과민성), 간기능 이상이 나타날 수 있으므로 간기능 검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 4) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 5) 정신신경계 : 때때로 휘청거림, 무력감, 권태감, 어지러움, 드물게 두통, 두중감, 졸음 등이 나타날 수 있습니다.
- 6) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 복통, 위·복부불쾌감, 구역, 구토, 설사, 구갈, 드물게 변비, 위·복부팽만감, 위정체감, 가슴쓰림(정체에 한함)등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 기타 : 혈압강하, 드물게 가려움, 하지무력감이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지하십시오.
- 2) 졸음, 주의력, 집중력, 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

6. 상호작용

- 1) 메토카르바몰과 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 2) 골격근 이완제(단트론헤나트륨)와 병용시 근이완작용이 증강될 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 3) 아미노글리코시드계 항생물질과 병용시 신경근차단작용에 의해 호흡억제가 증강될 수 있으므로 신중히 투여하십시오.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단하십시오.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【저장방법】

- 페리손정 : 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 페리손주 : 차광밀봉용기

【포장단위】

- 페리손정 : 10, 30, 100, 500, 1000정
- 페리손주 : 1mL×10, 30, 50명플

- ※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.
- ※ 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어아하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이이드릭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → “정보마당” → “의약품 정보”를 참조하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사, 약사와 상담 후 사용하십시오.
- ※ 사용(유통)기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 본 제품은 소비자피해보상규정(재정경제부고시)에 의거 정당한 소비자 피해에 대하여 보상해 드립니다.
- ※ 본사는 고객 상담 전용 수신자부담 전화(080-200-0101)를 운영하고 있습니다.
- ※ 의사, 약사는 의약품 등의 투여 사용 중 유해사례나 약물유해반응이라고 판단되는 경우 이를 의약품 안전성 정보 보고 절차에 따라 전화, 팩스, 전자문서 또는 인터넷을 통해 식약청장, 관련 협조단체장, 또는 제조업자에게 보고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 최신의 의약품안전성 정보는 신풍제약(주) 홈페이지(www.shinpoong.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

3-079(S), 3-032(S)

설명서 작성년월일 19960613

개정년월일 20091022



민족의 슬기와 금지로 인류의 건강을 위하여

신풍제약주식회사

경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 TEL)031-491-6191-2