

Aldioxa 함유 제산소화제

그랑파제®

삼중정

GRAND-PAZE

1000정



본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75
공장: 경기도 화성시 향남면 상신리 903-2

분류번호 239

우리나라 사람들은 자극성 음식과 채식을 많이 하는 편이므로 위 및 십이지장궤양, 소화불량이 많이 발생하고 있습니다. 그랑파제는 삼중정으로 되어 있어 복용시 위내에서 먼저 상하층(제산제, 위보호제층)이 녹아 위장을 보호하고 위내의 산도를 조절하여 소화효소제가 충분히 작용할 수 있는 상태로 한 후 중간층(소화효소층)이 녹아 소화를 시키므로 소화불량, 위산과다를 효과적으로 치료합니다.

■ 성분 · 함량 : 1정 중

〈상층〉

메타규산알루미늄마그네슘(식품의약품안전청고시 제98-127호)·····	30mg
탄산수소나트륨(약전)·····	100mg
탄산마그네슘(약전)·····	32.5mg
알디옥사(약전)·····	12.5mg

〈중층〉

메타규산알루미늄마그네슘(식품의약품안전청고시 제98-127호)·····	65mg
스코폴리아엑스(약전)(히요스시아민으로 0.03mg)·····	5mg
비오디아스타제 1000(별첨)·····	15mg
리파제 AP6(별첨)·····	5mg

〈하층〉

메타규산알루미늄마그네슘(식품의약품안전청고시 제98-127호)·····	30mg
탄산수소나트륨(약전)·····	100mg
탄산마그네슘(약전)·····	32.5mg
알디옥사(약전)·····	12.5mg

일반의약품

KGMP 적격업체

■ 성 상

상 · 하층은 백색내지 유백색이고 중간층은 연갈색의 원형 삼중정입니다.

■ 효능 · 효과

과식, 소화불량, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 소화촉진, 식욕감퇴(식욕부진), 식체(위체), 위부불쾌감, 속쓰림, 구역, 구토, 신트림, 위산과다, 위통

■ 용법 · 용량

성인 1회 2정, 1일 3회 식후 또는 식간에 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약으로 인해 알레르기증상(발진, 발적, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 투석요법을 받고 있는 환자
3. 부작용
 - 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기증상(발진, 가려움증 등)이 나타날 때에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
 - 2) 2주 정도 복용하여서 증상의 개선이 없을 때에는 복용을 중지

하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

- 3) 위장 진통 · 진경제와 함께 복용하지 마십시오.
- 4) 이 약은 7세 미만의 유아에게는 복용시키지 마십시오.
- 5) 장기연용을 하지 않습니다.
- 6) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 차광밀폐용기

■ 제조번호 :

■ 사용기한 :



■ 유통도중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 교환하여 드리오니 담당 사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다.
인국약품(주) 소비자 상담실 TEL.(02)3289-4253~9
수신자부담 : 080-001-4125